


BỘ Y TẾ

CẤP CỨU BAN ĐẦU

SÁCH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

Chủ biên:
ThS. NGUYỄN MẠNH DŨNG



BỘ Y TẾ

CẤP CỨU BAN ĐẦU

SÁCH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

Mã số: T.10. Z.10

Chủ biên: ThS. NGUYỄN MẠNH DŨNG



CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN:

Vụ Khoa học & Đào tạo, Bộ Y tế

CHỦ BIÊN:

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

NHỮNG NGƯỜI BIÊN SOẠN:

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng

CNDD. Tống Vĩnh Phú

THAM GIA TỔ CHỨC BẢN THẢO:

ThS. Phí Văn Thâm

CN. Đoàn Thị Nhuận

ThS. Phí Nguyệt Thanh

© Bản quyền thuộc Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo)



LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo trung cấp ngành Y tế. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy - học các môn cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Sách *Cấp cứu ban đầu* được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo lâu năm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam. Sách trang bị những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành điều dưỡng cho học sinh hệ điều dưỡng trung cấp tại Trường đại học Điều dưỡng Nam Định.

Sách *Cấp cứu ban đầu* đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy - học hệ trung cấp và dạy nghề của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2008. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành Y tế. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn các giảng viên Bộ môn Điều dưỡng Trường đại học Điều dưỡng Nam Định đã dành nhiều công sức để hoàn thành cuốn sách này; cảm ơn BS. Nguyễn Thị Liên, BS. Dương Thị Thu đã đọc, phản biện để cuốn sách được hoàn chỉnh kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo nhân lực ngành y tế.

Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ



MỤC LỤC

<i>Lời giới thiệu</i>	3
1. Tổ chức cấp cứu hàng loạt	7
2. Phân loại và chọn lọc người bị nạn	15
3. Sơ cứu vết thương	22
4. Phòng chống sốc	29
5. Sơ cứu người bị bỏng	45
6. Cầm máu – ga rô	56
7. Cấp cứu người bị ngừng hô hấp – ngừng tuần hoàn	67
8. Sơ cứu gãy xương	78
9. Vận chuyển nạn nhân	91
Đáp án câu hỏi tự lượng giá	98
Tài liệu tham khảo	99

TỔ CHỨC CẤP CỨU HÀNG LOẠT

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các yếu tố cần thiết để tổ chức một đơn vị cấp cứu.
2. Trình bày mục đích, nguyên tắc và các bước cấp cứu ban đầu người bị nạn.
3. Trình bày được các biện pháp để phòng thương vong hàng loạt.
4. Rèn luyện được tính khẩn trương, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật trong cấp cứu người bị nạn.


1. CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC ĐƠN VỊ CẤP CỨU

1.1. Người cứu

* Số lượng người cấp cứu

- Tùy thuộc vào quy mô sản xuất, số lượng người lao động, nhìn chung mỗi đơn vị lao động, sản xuất phải tổ chức một tổ cấp cứu.
- Mỗi phân xưởng sản xuất hoặc tổ lao động tương đương phải tổ chức một tổ cấp cứu theo quy định:
 - + Dưới 50 người lao động phải có ít nhất 2 cấp cứu viên
 - + Từ 50-100 người lao động phải có 4 cấp cứu viên
 - + Từ 101-200 người lao động phải có 8 cấp cứu viên
 - + Từ 201-300 người lao động phải có 12 cấp cứu viên
 - + Từ 300 người lao động phải có ít nhất 15 cấp cứu viên
- Trong trường hợp tổ chức lao động theo ca thì mỗi ca làm việc cũng phải có đủ số người cấp cứu theo quy định trên.
- Cung cấp thông tin về những người cấp cứu.

Người sử dụng lao động phải có bảng thông báo đặt ở nơi dễ nhận thấy tại nơi làm việc có ghi tên và nơi làm việc của người cấp cứu, nếu có từ 3 người trở lên phải có người phụ trách (tổ trưởng)



*** Tiêu chuẩn lựa chọn người cấp cứu**

Người sử dụng lao động cần tuyển thêm hoặc lựa chọn những người thích hợp để đưa đi đào tạo về cấp cứu ban đầu. Những người cấp cứu ban đầu phải có đủ các đức tính sau:

- Cẩn thận và có trách nhiệm
- Bình tĩnh trong trường hợp khẩn cấp
- Có thể ngừng và rời ngay công việc để cấp cứu
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn

Người cấp cứu phải được huấn luyện phương pháp cấp cứu: Một người được xem là đã được đào tạo nếu người đó đã học qua một lớp về cấp cứu, sau khóa học, học viên phải được cấp chứng chỉ khi vượt qua các kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành.

*** Trách nhiệm của người cấp cứu**

- Chịu trách nhiệm trong các trường hợp có tai nạn

Người cấp cứu đóng góp một vai trò hết sức quan trọng trong cấp cứu ban đầu đặc biệt trong cấp cứu hàng loạt, khi có người bị thương, người cấp cứu cần phải:

- + Đánh giá được sự việc xảy ra mà không gây nguy hiểm cho tính mạng bản thân.
- + Phát hiện những người bị thương.
- + Thực hiện việc điều trị cấp cứu ngay lập tức tùy theo từng loại thương tích. Phải luôn nhớ rằng một người bị thương có thể có nhiều vết thương và có thể có nhiều người cần được chăm sóc, cấp cứu ngay trong một thời điểm (cấp cứu hàng loạt).
- + Ngay lập tức sắp xếp để đưa người bị thương tới cơ sở y tế, bệnh viện hoặc về nhà tùy theo mức độ nặng nhẹ của vết thương. Khi chuyển nạn nhân vào viện phải có người đi cùng để theo dõi tình trạng nạn nhân và sẵn sàng cấp cứu khi cần thiết.
- Cung cấp thông tin cho y tế về vụ tai nạn và những cấp cứu đã làm đối với nạn nhân. Trách nhiệm của người cấp cứu tại chỗ chỉ kết thúc khi những người bị thương đã được chuyển tới cơ sở y tế hoặc người chăm sóc thích hợp.
- Lưu trữ hồ sơ: người cấp cứu cần phải ghi chép đầy đủ và lưu giữ các hồ sơ cấp cứu theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Trách nhiệm bảo quản các phương tiện cấp cứu tại chỗ: người cấp cứu ban đầu có trách nhiệm phải bảo quản túi, dụng cụ cấp cứu và bảo đảm có đầy đủ để sử dụng khi cần thiết (định kỳ kiểm tra và bổ sung đầy đủ dụng cụ).



1.2. Thuốc và dụng cụ cấp cứu

- Thiết kế túi thuốc cấp cứu: các túi thuốc cấp cứu nên làm bằng chất liệu bền chắc và có thể xách, đem đến nơi xảy ra tai nạn, túi phải được dán nhãn và dễ nhận biết.
- Vị trí đặt túi thuốc cấp cứu: nên đặt túi thuốc ở nơi dễ thấy, và dễ lấy. Nếu cơ sở có đông người thì nên cung cấp một số lượng túi đủ lớn thích hợp để tiện lợi cho việc cấp cứu khi cần thiết. Thông báo cho người lao động biết vị trí đặt túi thuốc và dụng cụ cấp cứu.
- Các dụng cụ cấp cứu: túi cấp cứu không chỉ bao gồm có thuốc, mà nó còn phải có các trang thiết bị, dụng cụ khác cần thiết để cấp cứu nạn nhân khi có các tình huống cấp cứu xảy ra. Các túi thuốc và dụng cụ cấp cứu phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo đầy đủ các cơ sở thuốc, dụng cụ cần thiết theo quy định.
- Các trang thiết bị tối thiểu của một túi cấp cứu gồm có:

TT	Số lượng	Túi A	Túi B	Túi C
	Các trang bị	(25 công nhân)	(50 công nhân)	(150 công nhân)
1	Băng dính (cuộn)	2	2	4
2	Băng cuộn nhỏ: 5x200 cm	2	4	6
3	Băng cuộn trung bình: 10x200cm	2	4	6
4	Băng cuộn to: 15x200cm	1	2	4
5	Gạc thấm nước: mỗi gói 10 miếng	1	2	4
6	Bông hút nước 9 gói	5	7	10
7	Băng tam giác	4	4	6
8	Ga rô cao su cỡ 6x100cm	2	2	4
9	Ga rô cao su cỡ 4x100cm	2	2	4
10	Kéo	1	1	1
11	Kim băng (cái)	4	4	6
12	Găng tay dùng 1 lần (đôi)	2	2	4
13	Mặt nạ phòng độc thích hợp	1	1	2
14	Nước vô khuẩn hoặc Dd nước muối 0,9% trong các bình chứa dùng một lần kích thước 100ml (chỉ ở nơi không có nước máy)	1	3	6
15	Nẹp cánh tay (bộ)	1	1	1
16	Nẹp cẳng tay (bộ)	1	1	1
17	Nẹp đùi (bộ)	1	1	2
18	Nẹp cẳng chân (bộ)	1	1	2
19	Thuốc sát trùng (lọ)	1	1	2
20	Phác đồ cấp cứu	1	1	1

Số lượng túi cấp cứu: số lượng túi cấp cứu hoặc số thùng đựng dụng cụ cấp cứu cần thiết phụ thuộc vào cách sắp xếp tại cơ sở và số lượng người lao động. Nên có ít nhất một túi hoặc một thùng đựng dụng cụ cấp cứu ở mỗi tầng nhà, tổng số các loại túi cấp cứu phụ thuộc theo số lượng người lao động.

Số lượng người lao động	Số lượng và loại túi cấp cứu
> 25 người	ít nhất 1 túi loại A
50 người	ít nhất 1 túi loại B
100 người	ít nhất một túi loại C

1.3. Phòng cấp cứu (nơi cấp cứu)

- Thiết kế: theo quy định cơ sở sản xuất có trên 500 người lao động phải có một phòng cấp cứu, phòng cấp cứu được thiết kế đủ rộng có thể kê được một chiếc giường và có khoảng trống để đi lại dễ dàng, có đèn chiếu sáng, có biển báo (ghi tên) để dễ nhận biết. Trong phòng được trang bị một số phương tiện dụng cụ để phục vụ cho công tác cấp cứu.
- Vị trí: phòng cấp cứu nên được bố trí có nơi vệ sinh riêng hoặc gần nhà vệ sinh công cộng, gần cầu thang, gần đường đi rộng để xe cấp cứu vào và ra được, và điều quan trọng phòng cấp cứu phải được bố trí gần nơi làm việc của người lao động.
- Các trang thiết bị của phòng cấp cứu:

Một phòng cấp cứu cần được trang bị: bồn rửa đủ nước sạch, xà phòng, bàn chải, giấy lau, sàn bằng phẳng. Băng vô khuẩn và dụng cụ khác để xử lý vết thương. Phác đồ cấp cứu, cánh thương, nẹp cánh tay, cẳng tay, đùi, cẳng chân, nhiệt kế. Giường, gối, chăn, tủ đựng dụng cụ cấp cứu, quần áo sạch dùng cho người cấp cứu, thùng chứa rác thải, ghế ngồi...

2. BIỆN PHÁP CẤP CỨU

* Mục đích cấp cứu

Cấp cứu người bị nạn ngay sau khi bị nạn tại nơi xảy ra tai nạn còn gọi là cấp cứu ban đầu là khâu quan trọng nhất trong công tác cấp cứu hồi sức. Cấp cứu ban đầu là thực hiện tại chỗ một số động tác cơ bản nhằm mục đích:

- Duy trì hoặc thay thế tạm thời các chức năng sống bị tổn thương hoặc hạn chế bởi các tư thế không tốt do tai nạn gây ra, trong khi chờ đợi kịp cấp cứu chuyên khoa đến hoặc trong khi vận chuyển nạn nhân.
- Mau chóng hạn chế hoặc làm ngừng sự phát triển của bệnh tật hoặc tai nạn ngay từ những phút đầu như: cầm máu, ga rô (trong trường hợp rắn độc cắn).



- Hạn chế, giảm bớt sự đau đớn quá mức của bệnh do tai nạn hoặc bệnh tật gây ra. Giảm bớt đau đớn còn có tác dụng phòng ngừa biến chứng sốc có thể dẫn tới tử vong.

*** Nguyên tắc cấp cứu**

Cấp cứu ban đầu đôi khi rất phức tạp nếu nạn nhân bị ngừng tim, ngừng thở. Trong nhiều trường hợp cấp cứu ban đầu chỉ cần vài động tác đơn giản làm đúng kỹ thuật là đã có thể cứu sống nạn nhân.


Cấp cứu ban đầu được thực hiện theo nguyên tắc sau:


- Loại bỏ nguyên nhân gây tai nạn.
 - + Điện giật: cắt nguồn điện (tách rời người bị nạn ra khỏi nguyên nhân gây nạn)...
 - + Vùi lấp: đào bới lấy nạn nhân ra khỏi nơi vùi lấp
 - + Đuối nước: vớt nạn nhân lên bờ
 - + Bỏn: tách nạn nhân ra khỏi nguyên nhân gây bỏng...
- Xử trí cấp cứu theo trình tự (tóm tắt theo sơ đồ 1.1).
 - + Đặt nạn nhân ở tư thế đúng, thích hợp tùy theo nguyên nhân và tình trạng của nạn nhân (thông thường nằm ngửa đầu thấp nghiêng về một bên).
 - + Duy trì sự sống cho nạn nhân bằng các biện pháp: khai thông đường thở, dẫn lưu rãi nhót, hút đờm rãi, móc họng lấy dị vật... Hô hấp nhân tạo bằng tay hoặc bằng dụng cụ (bóp bóng), thổi ngạt (miệng - miệng). Hồi sức tuần hoàn: ép tim ngoài lồng ngực nếu ngừng tim... Ngăn ngừa tình trạng nặng thêm: cầm máu, chống sốc, băng vết thương, bất động gãy xương...
 - + Giúp cho nạn nhân bình phục: động viên an ủi nạn nhân, tìm mọi cách để làm giảm đi sự đau đớn, hạn chế di chuyển nạn nhân, chống nóng hoặc ủ ấm cho nạn nhân.
 - + Vận chuyển nạn nhân đến cơ sở cấp cứu, điều trị thực thụ: sắp xếp, phân loại và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất để được điều trị hoặc về nhà tùy theo tình trạng và mức độ nặng nhẹ của vết thương, vận chuyển nạn nhân trong tư thế thích hợp.

3. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG THƯƠNG VONG HÀNG LOẠT

Tại nơi làm việc có nguy cơ cao về thương vong hàng loạt, người quản lý cần phải chuẩn bị sẵn sàng một số điều kiện và trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng tổ chức cấp cứu người bị nạn đặc biệt trong trường hợp có nhiều người cùng bị nạn một lúc.

- Nơi an toàn đủ rộng và chuẩn bị sẵn các trang bị như cáng, xe cáng, xe đẩy, chiếu... để làm nơi cấp cứu người bị nạn với số lượng lớn.





Sơ đồ 1.1. Xử trí cấp theo trình tự

- Cần phải có các bảng hướng dẫn đặc biệt đối với những nơi có sử dụng các hóa chất, trang thiết bị dụng cụ có nguy cơ gây nên tai nạn cho người sử dụng.
 - + Khi sử dụng hóa chất có nguy cơ gây thương vong hàng loạt, tại nơi làm việc cần có các bản viết các hướng dẫn, cách xử trí đối với người lao động bị thương do các loại hóa chất đó để mọi người biết khi có tai nạn xảy ra.
 - + Đối với trường hợp có nguy cơ bị ngạt thở do hơi, khí độc, người cấp cứu phải sử dụng mặt nạ phòng độc, khi chạy vào nơi có phát sinh ra khí độc thì phải chạy theo chiều gió. Nếu không có mặt nạ thì phải dùng khăn ướt, vải ướt bịt kín miệng, mũi.



- + Nếu sử dụng một hóa chất có chất đối kháng ví dụ: như amylnitrat đối kháng với cyamid thì nên có chất đối kháng ở trong túi cấp cứu, nên viết rõ ràng các hướng dẫn về cách sử dụng chất đối kháng đó.
- Có đầy đủ quần áo và trang bị bảo hộ.
 - + Cung cấp quần áo và trang bị bảo hộ ở nơi có khả năng người cấp cứu cần bảo vệ để tránh khỏi bị thương trong khi đang tiến hành cấp cứu, nên cất giữ thích hợp, kiểm tra thường xuyên quần áo và trang bị bảo hộ để đảm bảo nó luôn ở điều kiện tốt.
 - + Để tránh các lây truyền qua đường máu như viêm gan B, HIV...phải đeo găng tay sử dụng một lần khi phải tiếp xúc với máu, dịch của nạn nhân.
- Làm sạch môi trường.
 - + Người cấp cứu phải rửa tay hoặc tắm rửa bằng xà phòng càng sớm càng tốt sau khi cấp cứu người bị nạn.
 - + Tẩy rửa các vết máu (nếu có) trên bề mặt trang thiết bị, dụng cụ hoặc đồ dùng, sàn nhà cấp cứu bằng các loại hóa chất khử khuẩn, tẩy uế các dụng cụ đã sử dụng bằng hóa chất khử khuẩn sau đó cọ rửa bằng nước xà phòng, rửa lại bằng nước sạch, lau khô rồi tiệt khuẩn theo đúng quy trình.
- Lưu giữ các hồ sơ: lưu giữ hồ sơ cấp cứu theo biểu mẫu quy định

Hồ sơ cấp cứu ban đầu

Ngày tháng năm	Số TT	Họ tên nạn nhân	Ngày giờ bị tai nạn	Ngày/giờ cấp cứu	Tình trạng nạn nhân, thương tích	Tai nạn do gì	Phương pháp cấp cứu	Thời gian nghỉ việc	Kết quả giám định % mất sức lao động

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1. Ba yếu tố cần thiết để tổ chức được một đơn vị cấp cứu người bị nạn là:

A: Người làm công tác cấp cứu

B:

C:.....



2. Ba loại băng thường xuyên có trong túi cấp cứu là

A:

B: Băng dính

C:.....

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái thích hợp.

3. Túi thuốc cấp cứu loại A được bố trí thích hợp nhất cho cơ sở sản xuất có

A: 15 người

B: 20 người

C: 25 người

D: 30 người

4. Túi thuốc cấp cứu loại B được bố trí thích hợp nhất cho cơ sở sản xuất có

A: 30 người

B: 40 người

C: 50 người

D: 60 người

5. Túi thuốc cấp cứu loại C được bố trí thích hợp nhất cho cơ sở sản xuất có

A: 70 người


B: 80 người

C: 90 người

D: 100 người

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (V) vào cột A cho câu đúng, cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
6	Khi có trường hợp cấp cứu người làm nhiệm vụ cấp cứu phải rời ngay vị trí làm việc để đi cấp cứu		
7	Phòng cấp cứu nên bố trí gần nhà vệ sinh nhưng không nên gần nơi làm việc		
8	Cơ sở sản xuất có nguy cơ gây thương vong hàng loạt cần chuẩn bị sẵn một khu an toàn để tản cư và sẵn sàng cấp cứu		
9	Cơ sở sản xuất sử dụng các hóa chất độc hại nguy cơ gây tai nạn hàng loạt không nên thông báo cho mọi người biết trước		
10	Trong mọi trường hợp cấp cứu người cứu không cần phải đi gắng tay		



PHÂN LOẠI VÀ CHỌN LỌC NGƯỜI BỊ NẠN


MỤC TIÊU

1. *Nêu được các nguy cơ gây thương vong hàng loạt trong lao động và sinh hoạt.*
2. *Trình bày được cách phân loại và chọn lọc người bị nạn.*
3. *Trình bày được cách xử trí cấp cứu một số trường hợp bị nạn hay gặp.*
4. *Thể hiện được tính khẩn trương, nhanh nhẹn, cẩn thận, nhẹ nhàng, chuẩn mực trong khi cấp cứu người bị nạn.*

Hiện nay nguy cơ xảy ra thương vong hàng loạt ngày càng cao với quy mô lớn. Nhờ có những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, những vũ khí giết người hàng loạt: vũ khí nguyên tử, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học... đã được sử dụng gây nên sự thương vong hàng loạt. Sản xuất công nghiệp phát triển với quy mô lớn, cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp, căng thẳng cũng là những yếu tố gây nên tai nạn thương tích và thương vong hàng loạt. Yêu cầu đặt ra là cần tổ chức cấp cứu hàng loạt cho nạn nhân khi xảy ra không những trong chiến tranh mà còn cả trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Trong phạm vi bài này chỉ đề cập đến việc tổ chức cấp cứu hàng loạt khi sử dụng vũ khí thông thường và các tai nạn trong đời sống lao động và sinh hoạt.

1. CÁC NGUY CƠ GÂY TAI NẠN THƯƠNG VONG HÀNG LOẠT

- Trang thiết bị kỹ thuật: thiết bị kỹ thuật thiếu hoặc thiết kế sai, không đảm bảo an toàn sẽ tạo ra nguy cơ dẫn đến tai nạn cho người lao động, người sử dụng trang thiết bị kỹ thuật.
- Điều kiện làm việc: điều kiện làm việc không tốt, không thuận lợi, không phù hợp là những yếu tố có ảnh hưởng gián tiếp đến các trường hợp tai nạn. Các yếu tố đó có thể là: sự khó chịu không thuận lợi cho người lao động làm việc tại nơi làm việc, tiếng ồn, nhiệt độ cao, hệ thống thông gió không đảm bảo gây thiếu oxy và tăng nhiệt, ánh sáng không đủ làm giảm khả năng nhìn của người lao động...
- Con người
 - + Nhà quản lý: là người sử dụng lao động, phải là người chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và sắp xếp bố trí nơi làm việc thuận lợi, an toàn để hạn chế tai nạn cho người lao động.



- + Kinh nghiệm nghề nghiệp của người lao động: giai đoạn đầu tiên khi làm một công việc mới hoặc một quy trình mới thường là giai đoạn mắc lỗi nhiều nhất dễ gây tai nạn.
- + Tuổi của người lao động: những người lao động càng nhiều tuổi (già hơn) thì nguy cơ bị tai nạn càng nhiều hơn.
- Thông tin và các chỉ dẫn về phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn: tại môi trường làm việc không có hoặc thiếu các bảng chỉ dẫn quy trình làm việc, thao tác các thiết bị.

2. PHÂN LOẠI VÀ CHỌN LỌC NGƯỜI BỊ NẠN

2.1. Nguyên tắc


Khi có thương vong hàng loạt việc phân loại và chọn lọc người bị nạn cần phải được đặt ra và có vai trò hết sức quan trọng nhằm cứu chữa nhanh chóng, kịp thời có hiệu quả cho người bị nạn. Tuy nhiên trong quá trình phân loại và chọn lọc người bị nạn cần phải tuân thủ nguyên tắc sau:

- Phải chăm sóc và điều trị được tốt nhất cho nhiều người.
- + Tìm ra người ưu tiên cần được cấp cứu ngay nếu không sẽ tử vong.
- + Với bất cứ vết thương nào được điều trị sớm đến khi khỏi là lý tưởng nhất (tuy nhiên còn phụ thuộc: trang thiết bị, kỹ thuật, tình hình chiến sự ...do đó cần linh hoạt xử trí).
- Phân loại: việc phân loại người bị nạn cần phải được tiến hành khẩn trương ngay tại nơi xảy ra tai nạn. Nạn nhân nên được chia làm 4 loại : Tối khẩn cấp – khẩn cấp – nhẹ – nguy cơ tử vong.
- Chọn lọc: để chọn lọc người bị nạn được chính xác cần phải dựa vào triệu chứng toàn thân, tại chỗ.
- Các tuyến sau phải khám lại nạn nhân không bỏ sót tổn thương của tuyến trước.
- Việc phân loại chọn lọc cần bác sĩ có kinh nghiệm kết quả phân loại ảnh hưởng lớn đến hiệu quả điều trị.

2.2. Cách phân loại và chọn lọc

Việc phân loại và chọn lọc người bị nạn cần phải được tiến hành khẩn trương ngay tại nơi bị nạn cũng như tại các tuyến điều trị nhằm mục đích cứu chữa người bị nạn nhanh chóng, kịp thời và có hiệu quả. Người bị nạn có thể chia làm 4 loại để làm căn cứ cấp cứu hồi sức cũng như phẫu thuật:

- Loại 1: Tối khẩn cấp, cần được xử trí ngay hồi sức hoặc mổ ngay...nếu không nạn nhân có thể tử vong do chảy máu nặng, hoặc ngạt thở tràn khí màng phổi van, vết thương mạch máu đang chảy...



- Loại 2: Khẩn cấp, thuộc loại cấp cứu phải xử trí có thể trì hoãn chút ít, gãy xương hở, vết thương mạch máu ở chi đã ga rô...
- Loại 3: Bị thương nhẹ (vết thương phần mềm) xử lý sau khi cấp cứu xong các trường hợp khác.
- Loại 4: Những người bị thương nặng sắp chết thì để lại sau cùng, nếu còn khả năng mới mổ. Trong những trường hợp này cần đánh giá đúng mức tình trạng mất máu, ngạt, suy hô hấp để chọn lọc đúng.

Phòng hoặc nơi được lựa chọn là điểm để tiến hành phân loại, chọn lọc nạn nhân phải gần phòng mổ (đã chiến) hoặc gần đường giao thông để tiện việc chuyển người bị nạn về tuyến sau. Có thể dùng phản hoặc chiếu trải xuống đất, sau đó đặt nạn nhân lên thì dễ chọn lọc hơn. Sau khi chọn lọc cần có phiếu ghi: tên, tuổi, giới tính, trên phiếu có in sẵn sơ đồ hình người (mặt trước và sau).

Tuỳ theo nạn nhân bị thương ở đâu thì được đánh dấu vào chỗ đó và có ký hiệu riêng cho từng loại thương tổn (4 loại). Có thể ký hiệu màu cho từng loại, loại I: màu đỏ, loại II : màu vàng, loại III: màu xanh lá cây, loại IV: màu đen.

Trường hợp người bệnh không có giấy tờ và không trả lời được thì phải đánh số và ước lượng tuổi, cần cởi hết quần áo của người bệnh để tránh bỏ sót tổn thương sau đó chỉ đắp chăn hoặc vải mỏng. Không cho người nhà và người không có phận sự vào khu vực chọn lọc, gây khó khăn cho việc phân loại.

2.3. Tổ chức phân loại và chọn lọc người bị nạn


Muốn phân loại và chọn lọc người bị nạn được tốt cần:

- Phải có tổ chức tốt, phải có dự kiến tổ chức về người, có phân công từng người để bắt tay vào việc ngay trong bất cứ hoàn cảnh nào và thực hiện nhiệm vụ được giao cho tuyến mình.
- Phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác phân loại cũng như cấp cứu người bị nạn khi cần thiết: giấy tờ ghi chép, phiếu chuyển thương, biểu mẫu tổng kết, phương tiện để đánh dấu từng loại khi chuyển vận (băng vải có các màu để dính vào áo nạn nhân) hay khi chờ để được điều trị.
- Ngay trong khi phân loại và chọn lọc, cũng phải có người và dụng cụ sẵn sàng để cấp cứu cũng như săn sóc nạn nhân khi cần thiết.

3. XỬ TRÍ CẤP CỨU BAN ĐẦU MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

3.1. Nạn nhân bị điện giết

Tai nạn điện giết gây ảnh hưởng đến tim và nhanh chóng gây tử vong. Mặt khác khi bị tai nạn người bị nạn có thể bị tổn thương thêm do bị ngã từ trên cao xuống: giàn giáo, cầu thang, lan can nhà cao tầng...



- Nguyên tắc xử trí:
 - + Cấp cứu ngay lập tức
 - + Cấp cứu tại chỗ
 - + Cấp cứu kiên trì và liên tục

- Các bước xử trí

- + Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện bằng cách:



- Cắt cầu dao điện, cầu chì ở gần...là an toàn nhất.

- Nếu không biết cầu dao điện, cầu chì ở gần hoặc chúng ở xa thì người cứu nắm vật áo nạn nhân kéo ra (lưu ý: nếu áo ướt phải dùng vải khô, giấy khô hoặc nylon lót tay rồi mới nắm áo nạn nhân để tránh tình trạng truyền điện sang người cứu).

- Dùng vật cách điện như: gậy tre, gỗ khô tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

- Dùng dao chuôi gỗ, sừng, cuốc sắc có cán gỗ chặt dây điện.

- + Tiến hành các bước cấp cứu nạn nhân như cấp cứu ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn



Hình 2.1. Sơ cứu nạn nhân bị điện giật

3.2. Nạn nhân bị vùi lấp

- Bới để lấy nạn nhân ra khỏi nơi vùi lấp càng sớm càng tốt: tạo một lỗ thoáng để nạn nhân thở trước sau đó bới rộng để đưa nạn nhân ra ngoài.



Hình 2.2. Nạn nhân bị vùi lấp

- Cấp cứu ngưng thở trước nếu nạn nhân bị ngưng hoặc ngừng thở. Trong trường hợp có ngừng hô hấp và tuần hoàn phải tiến hành cấp cứu đồng thời cả hô hấp và tuần hoàn.

- Làm các sơ cứu khác: xử trí vết thương phần mềm, vết thương mạch máu, bất động gãy xương... (nếu có).

- Duy trì thân nhiệt bằng cách ủ ấm cho nạn nhân nếu trời lạnh hoặc để nạn nhân nơi thoáng mát.

- Cho nạn nhân uống nước chè đường.

- Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa.



**THƯ VIỆN
HUBT**

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THAM KHẢO NỘI BỘ

3.3. Nạn nhân chấn thương

Khi bị chấn thương hoặc tai nạn giao thông người bị nạn có thể gặp phải một số tình huống sau:

- Thủng hoặc rách ổ bụng, ruột bị lòi ra ngoài: người cấp cứu cần hết sức bình tĩnh, đừng cố gắng nhét ruột trở lại bụng. Cần lấy tấm băng, gạc lớn, mềm, sạch quấn ngang bụng tạm thời cho bệnh nhân để cố định chỗ bị thương. Không được băng quá chặt sẽ khiến bệnh nhân bị ngạt thở, sau đó đặt nạn nhân lên cangk ở tư thế nằm ngửa rồi chuyển đến bệnh viện (lưu ý: khi khiêng nạn nhân cần giữ ở tư thế nằm, nếu đặt nạn nhân ở tư thế ngồi có thể khiến ruột bị lòi thêm ra).
- Vật nhọn đâm vào cơ thể, nhất là ngực, bụng: tuyệt đối không được rút vật nhọn đó ra, vì trong lúc này các vật đó có tác dụng bít mạch máu, nếu rút ra, máu sẽ phun mạnh, người bệnh mất máu nhiều, có thể bị tử vong. Để nạn nhân ở tư thế dễ chịu nhất (tùy từng trường hợp mà lựa chọn tư thế đứng hay ngồi. Chính nạn nhân sẽ cảm nhận được chính xác tư thế nào họ sẽ thấy dễ chịu nhất). Chuyển ngay nạn nhân đến bệnh viện gần nhất có khả năng cứu chữa kịp thời. Trong trường hợp bị gãy nhiều xương sườn: nạn nhân thường rất đau và khó thở, lúc này, nên đặt nạn nhân ở tư thế nằm đầu hơi cao - tư thế này giúp bệnh nhân dễ thở hơn, rồi chuyển ngay đến bệnh viện.
- Gãy xương (thường là bị gãy cangk chân, tay): nhận định được nạn nhân bị gãy xương thường dựa vào triệu chứng đau và có khả năng mất vận động bên bị gãy, tại chỗ sưng, tím, thậm chí còn thấy xương gãy lòi ra trong trường hợp gãy hở.



Hình 2.3. Vết thương ngực

Xử trí: cần đặt nạn nhân ở tư thế nằm và không nên có những tác động vào ổ gãy, vì tất cả những can thiệp đó có thể làm cho xương bị di lệch thêm, tuyệt đối không kéo, nắn xương cho nạn nhân. Tốt nhất, nên nẹp tạm thời chỗ xương gãy lại, dù có thể không biết nẹp đúng quy cách, nhưng sẽ hạn chế di động của xương và để nạn nhân đỡ đau, sau đó đưa ngay nạn nhân đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời.

- Trường hợp bị chấn thương mạnh dẫn đến bị vỡ cơ hoành khiến dạ dày, ruột, gan chui hết lên phần ngực, đè vào phổi, tim, khiến nạn nhân rất khó thở.

Xử trí: Trong trường hợp này, tư thế tốt nhất là nằm cao, nửa nằm nửa ngồi, để tạo áp lực trên cangk đẩy bớt các cơ quan này xuống, nạn nhân sẽ dễ thở

hơn, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

3.4. Nạn nhân bị tai nạn giao thông

- Người không chảy máu, thậm chí đứng dậy được, vẫn cần cho nằm nghỉ để theo dõi nhịp thở, mạch, huyết áp.

Xử trí: trong trường hợp có gãy xương sơ cứu như người bị gãy xương. Nếu có chảy máu thì phải cầm máu tại chỗ bằng cách băng ép, băng nhồi (lấy một cục bông, gạc, khăn sạch đè mạnh vào vết thương - động tác rất đơn giản nhưng cầm máu hiệu quả rồi băng lại).



Hình 2.4. Tai nạn giao thông

- Nạn nhân trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh, cần chuyển ngay nạn nhân đến bệnh viện ở tư thế nằm. Lưu ý, phải cần từ 2-3 người để nâng, nhấc nạn nhân lên chứ không bế xốc bồng hay bế gập người lại, đưa nạn nhân đến chỗ an toàn và gọi xe cứu thương đến hoặc chuyển ngay nạn nhân đến bệnh viện để được xử trí cấp cứu.
- Sơ cứu: trong nhiều trường hợp, việc đầu tiên là cần phải kiểm soát được đường hô hấp cho nạn nhân, làm đường thở thông thoáng. Nếu đường thở bị tắc nghẽn do đất, cát, răng giả, đờm dãi... phải móc ngay ra. Nếu nạn nhân không thở được thì phải hô hấp nhân tạo. Muốn hạn chế tình trạng suy hô hấp thì nên đặt bệnh nhân nằm đầu cao. Nếu nạn nhân bị huyết áp thấp, hoặc có bệnh sọ não cần lưu ý không nên đặt nằm ở tư thế đầu quá cao.

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống

1. Mục đích của cấp cứu ban đầu làA...hoặc ...B....tạm thời các chức năng sống bị tổn thương hoặc hạn chế bởi các tư thế không tốt do tai nạn gây ra, trong khi chờ đợi kịp cấp cứu chuyên khoa đến hoặc trong khi vận chuyển nạn nhân.

2. Mục đích của cấp cứu ban đầu là mau chóng ...A...hoặc ...B... sự phát triển của bệnh tật hoặc tai nạn ngay từ những phút đầu như: cầm máu, ga rô (trong trường hợp rắn độc cắn).



3. Bốn nguy cơ gây tai nạn cho người lao động là:

A: Thiết bị kỹ thuật không đảm bảo

B:.....

C:

D: Thông tin chỉ dẫn: thiếu, không đúng

4. Bốn loại tai nạn thường gặp là:

A: Điện giật

B:

C: Tai nạn giao thông

D: Chấn thương

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho câu hỏi sau:

5. Biện pháp nào dưới đây là thích hợp nhất để tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

A: Cắt cầu dao điện

B: Dùng tay kéo nạn nhân ra

C: Dùng dao cắt đứt dây điện

D: Dùng que, gậy tách nạn nhân ra

6. Nguyên tắc nào dưới đây là quan trọng nhất được áp dụng trong xử trí cấp cứu ban đầu cho nạn nhân

A: Duy trì sự sống


B: Ngăn ngừa tình trạng nặng thêm

C: Giúp cho bình phục

D: Vận chuyển nạn nhân

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (V) vào cột A cho câu đúng, cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
7	Tiếng ồn và nóng bức là những yếu tố nguy cơ gây tai nạn cho người lao động		
8	Sau khi tách khỏi nguồn điện, phải khẩn trương chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để xử trí cấp cứu		
9	Cấp cứu người bị nạn do vùi lấp phải ưu tiên giải quyết về hô hấp trước		
10	Tai nạn lao động thường xảy ra ở người lao động cao tuổi		



SƠ CỨU VẾT THƯƠNG

MỤC TIÊU

1. Trình bày được mục đích, nguyên tắc và các kiểu băng cơ bản của băng cuộn.
2. Trình bày được cách theo dõi tuần hoàn của chi sau băng.
3. Trình bày được cách xử trí cấp cứu vết thương hở, kín.
4. Trình bày được cách xử trí cấp cứu một số vết thương đặc biệt.
5. Thực hiện được các kỹ thuật băng vết thương ở các vùng trên cơ thể.
6. Rèn luyện được tính nhanh nhẹn, cẩn thận, nhẹ nhàng, chính xác và thông cảm với nạn nhân trong xử trí cấp cứu vết thương.

Khi bị nạn, người bị nạn thường hay gặp phải các vết thương và vết thương đó là các vết đứt, thủng, gãy ở trên da hoặc cơ thể. Các vết thương được chia làm hai loại: vết thương hở và vết thương kín. Hầu hết các vết thương đều hở: đó là các vết thương làm rách, nứt da làm mất máu, dịch cơ thể, đồng thời mầm bệnh có thể xâm nhập gây nhiễm trùng. Vết thương kín là những vết thương làm tổn thương cơ quan tổ chức, gây nên sự chảy máu bên trong cơ thể (xuất huyết nội). Tùy theo loại vết thương mà có cách xử trí khác nhau tuy nhiên cho dù thuộc loại vết thương nào, nặng hay nhẹ thì trong quá trình sơ cứu người bị nạn cũng cần phải chú ý giữ vệ sinh vết thương và giữ cho bản thân người cứu không bị lây nhiễm các bệnh từ máu nạn nhân chảy ra.

1. KỸ THUẬT BĂNG VẾT THƯƠNG BẰNG BĂNG CUỘN

1.1. Mục đích băng

- Che chở bảo vệ vết thương.
- Giữ vật liệu băng tại chỗ (bông gạc, nẹp) trong băng vết thương.
- Băng ép cầm máu.
- Băng giữ nẹp trong cố định gãy xương.

1.2. Nguyên tắc băng

- Giải thích cho nạn nhân hiểu rõ mục đích, tác dụng của việc băng vết thương.



- Để nạn nhân ngồi hoặc nằm theo tư thế thoải mái, thuận tiện, chú ý những vị trí băng cần phải có người hỗ trợ (nâng, giữ) hoặc dùng giá đỡ để kê cao khi băng như: các vết thương ở chi, xương chậu.
- Phải lấy hết dị vật, rửa sạch vết thương, đắp lên bề mặt vết thương miếng gạc vô khuẩn trước khi băng.
- Khi băng, đặt đầu băng vào phía dưới nơi định băng (cách vết thương khoảng 10 cm), tay trái giữ lấy đầu băng, tay phải cầm thân băng vừa nói cuộn băng, vừa băng cho đến khi che kín vết thương.
- Đối với băng vết thương ở chi thì phải băng từ ngọn chi đến gốc chi, để không gây chèn ép, sung huyết, chú ý để hở các đầu chi để tiện việc theo dõi tuần hoàn của chi đó.
- Khi băng phải băng đều tay, đủ chặt, không lỏng quá dễ tuột, chặt quá người bệnh đau và ảnh hưởng đến lưu thông tuần hoàn của vùng băng. Vòng băng sau chồng lên vòng trước $1/2$ hoặc $2/3$ (chiều rộng của băng).
- Vòng cố định băng có tác dụng để giữ băng (có thể dùng kim băng, móc bấm, băng dính, nút buộc) xong chú ý tránh đè trực tiếp lên vết thương, vùng tỳ đè hoặc chỗ xương nhô ra.


* Các kiểu băng cơ bản

Có 6 kiểu băng cơ bản: Băng vòng, rắn quăn, xoáy ốc, chữ nhân, vòng gấp lại (băng hồi quy) và băng số 8. Tùy từng trường hợp, vị trí của vết thương trên cơ thể mà lựa chọn kiểu băng cho thích hợp.

- Băng vòng

Băng vòng là kiểu băng mà các vòng sau chồng khít lên vòng băng trước. Băng vòng được áp dụng để băng các vết thương ở cổ, trán hoặc được sử dụng như những vòng băng khởi đầu, kết thúc của những kiểu băng khác (vòng khoá).

- Băng rắn quăn



Hình 3.1. Băng vòng



Hình 3.2. Băng rắn quăn

- + Là kiểu băng: sau khi băng những vòng băng khóa ban đầu, băng chéo lên trên, ra sau và xuống dưới rồi lại đi về phía trước để tiếp tục những vòng băng sau. Trong kiểu băng rắn quăn: vòng băng sau tách rời (không chồng lên) vòng băng trước, giữa hai vòng băng có một khoảng trống.
- + Áp dụng: băng rắn quăn được áp dụng trong trường hợp băng đỡ gạc, nẹp trong bất động gãy xương.

- Băng xoáy ốc

- + Băng xoáy ốc là kiểu băng có đường băng đi theo hướng giống như băng rắn quăn (chéch lên trên, ra sau, xuống dưới rồi về trước). Vòng băng sau đè lên vòng băng trước 1/2 đến 2/3 chiều rộng của băng.



Hình 3.3. Băng xoáy ốc

- + Áp dụng: băng xoáy ốc được áp dụng để băng các vết thương ở cánh tay, ngón tay, đùi.

- Băng chữ nhân (có 2 kiểu)

- + Chữ nhân thường: băng 2 vòng đầu làm vòng khóa, băng chéo lên trên, ra sau, về trước rồi đi xuống dưới, cứ băng như thế cho đến khi băng che kín hết vết thương.



Hình 3.4. Băng chữ nhân

- + Băng chữ nhân gấp lại: giống như băng chữ nhân thường nhưng mỗi vòng trở xuống đều phải gấp lại sau đó băng che hết vết thương.

- + Băng chữ nhân được áp dụng để băng các vết thương ở cẳng tay, cẳng chân.

- Băng số 8


- + Băng số 8 là kiểu băng có đường đi: chéo lên trên, ra sau và xuống dưới rồi lại đi về phía trước. Vòng băng sau bắt chéo và đè lên vòng băng trước 1/2 hay 2/3 chiều rộng của băng. Các đường băng tạo nên hình số 8 tại vùng băng.



Hình 3.5. Băng số 8

- + Băng số 8 được áp dụng để băng các vết thương hoặc cố định xương ở vùng khớp, khuỷu (khuỷu tay, cổ tay, mắt cá chân, đầu gối), cố định gãy xương đòn.

- Băng vòng gấp lại (băng hồi quy)
 - + Băng vòng gấp lại là kiểu băng mà có nhiều đường băng cùng xuất phát và trở về tại 1 điểm. Đường băng đầu tiên thường đi chính giữa vết thương các đường băng sau lan rộng sang 2 bên cho đến khi che kín vết thương.



Hình 3.6. Băng vòng gấp lại

- + Băng vòng gấp lại thường được áp dụng để băng các vết thương vùng đỉnh đầu, đầu các ngón tay, mồm cụt.

1.3. Theo dõi biến đổi tuần hoàn chi sau khi băng


Sau khi băng vết thương cho nạn nhân xong, trong một số trường hợp cần phải theo dõi người bệnh để phát hiện tai biến cản trở sự lưu thông tuần hoàn do băng quá chặt gây nên.

- Bình thường sau khi băng vết thương xong, nạn nhân không có cảm giác gì đặc biệt ngoài cảm giác đau tại vết thương.
- Nếu băng quá chặt làm ảnh hưởng đến sự lưu thông tuần hoàn tại vùng cơ thể có vết thương có thể phát hiện được bằng các dấu hiệu sau:
 - + Hỏi: hỏi nạn nhân xem có cảm giác đau, nhức, khó chịu hoặc cử động khó ở nơi băng, hoặc chi bị băng.
 - + Nhìn: quan sát vùng băng thấy có biểu hiện phù nề, biến dạng hình dạng đầu các ngón của chi to hơn bình thường (nếu là băng chi), màu sắc: vùng băng có màu tím đỏ, hoặc thâm (ứ huyết).
 - + Sờ: đầu chi thấy lạnh, cấu véo người bệnh giảm cảm giác đau, không bắt mạch được ở phía dưới vùng tổn thương.
- Xử trí: nhanh chóng cởi băng, băng lại vừa phải, đảm bảo lưu thông tuần hoàn được tốt.

2. SƠ CỨU VẾT THƯƠNG HỖ

2.1. Các loại vết thương thường gặp

- Vết thương do bị rạch (Hình 3.7): đó là những vết cắt bằng một cạnh nhọn như lưỡi dao hay miếng kính bể. Vì các mạch máu ở rìa vết thương bị cắt ngang, do đó có thể bị chảy máu nhiều. Vết thương do bị rạch ở tay



chân cũng có thể làm cho các phần khác dưới da như gân chẳng hạn bị thương tích trầm trọng.

- Vết thương do bị rách (Hình 3.8): do lực ép và xoáy của máy móc sẽ tạo ra các vết rách trên da. Chúng có thể ít chảy máu hơn vết cắt nhưng các mô lại bị tổn thương và bầm nhiều hơn. Chúng cũng có thể bị lây nhiễm và nguy cơ lây nhiễm rất cao.
- Vết thương trầy sát (Hình 3.9): bề mặt của da bị trầy xước thường là do bị trượt té hoặc bị ma sát với các vật nào đó. Vết trầy xước thường bị nhiều vật ngoài xâm vào, do đó có thể gây viêm nhiễm.



Hình 3.7



Hình 3.8



Hình 3.9

- Vết bầm tím (Hình 3.10): bất kỳ sự tác động (cú đấm) nhẹ nào cũng có thể làm vỡ các mao mạch dưới da. Máu len vào các mô làm da bị bầm tím. Da có thể bị rạn nhưng thường là không nứt ra. Vết bầm bị thâm tím nặng cho biết bị tổn thương sâu bên trong hơn nhưng khó thấy như gãy xương hay bị thương tích bên trong.
- Vết thủng (Hình 3.11): vết thủng có diện tích nhỏ nhưng sâu gây thương tích bên trong là do bị đinh hay kim chích đâm. Mầm bệnh có thể đi vào cơ thể, do đó nguy cơ bị viêm nhiễm rất cao.
- Vết thương do bị bắn (Hình 3.12): đạn hay bất cứ vật ném nào cũng có thể đi vào hay xuyên qua cơ thể gây nội thương trầm trọng và bị viêm nhiễm. Vết thương do đạn bắn có đặc điểm tại đầu vào có thể nhỏ và hẹp nhưng đầu ra của nó (nếu có) thường lớn và bị dập nát tổ chức.



Hình 3.10



Hình 3.11



Hình 3.12

2.2. Cách sơ cứu

** Nguyên tắc sơ cứu:*

- Cầm máu để hạn chế mất máu
- Ngăn ngừa nạn nhân bị sốc
- Giảm thiểu nguy cơ bị viêm nhiễm
- Nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời

** Các bước sơ cứu ban đầu:*

Bước 1: cởi hoặc cắt quần áo nạn nhân ra để bộc lộ vết thương. Tìm xem có vật nhọn như mảnh kính có thể gây tổn thương cho người cứu, nạn nhân cần phải loại bỏ ngay.

Bước 2: dùng các ngón tay và lòng bàn tay nén chặt vết thương, nếu có lót một mảnh băng vô trùng hay một miếng gạc sạch thì tốt hơn - nhưng không được phí thời gian trong việc tìm kiếm băng quấn (Nén chặt vết thương trong ít nhất 10 phút để máu có thời gian đông lại). Nếu không thể tiến hành được như trên cần phải áp dụng cách nén trực tiếp, ví dụ do vật găm trong vết thương nhô ra, cần phải ấn chặt xuống hai bên vật đó.

Bước 3: nâng và giữ cánh tay của nạn nhân cao hơn tim. Cầm tay nạn nhân thật nhẹ nhàng nếu nạn nhân có bị gãy xương (nâng phần bị thương cao lên để máu chảy đến vết thương chậm đi).

Bước 4: có thể đỡ nạn nhân nằm xuống. Điều này sẽ làm giảm lưu lượng máu chảy đến các vết thương và giảm thiểu nguy cơ gây sốc.

Bước 5: giữ nguyên miếng gạc rồi dùng dải băng vô trùng băng bó vết thương thật chắc nhưng đừng chặt quá sẽ làm tắc nghẽn sự lưu thông máu. Nếu máu chảy qua dải băng cần phải băng phủ thêm một lớp nữa. Nếu có vật găm trong vết thương nhô ra, đặt miếng gạc lót đệm ở hai bên vật thể cho đến khi chúng vừa đủ cao để có thể băng lại mà không làm đụng chạm đến vật đó.

Bước 6: bảo đảm an toàn và nâng đỡ phần bị thương như khi bị gãy xương.

Bước 7: quay điện thoại (số 115) gọi cấp cứu. Xử trí sốc cho nạn nhân, kiểm tra cách băng bó vết thương, đồng thời theo dõi sự lưu thông máu bên dưới miếng băng.

3. SƠ CỨU VẾT THƯƠNG KÍN (CHẢY MÁU TRONG)

Chảy máu trong có thể theo sau thương tích như gãy xương hoặc vết thương có vật xuyên thủng, nhưng cũng có thể xảy ra một cách tự phát như chảy máu do loét dạ dày. Chảy máu trong rất nghiêm trọng mặc dù máu có thể không chảy ra ngoài cơ thể nhưng lại chảy ra khỏi vòng tuần hoàn và có thể gây sốc. Hơn nữa, máu ứ lại (khối choán chỗ) có thể đè nén có hại lên các cơ quan như phổi hay não.



3.1. Cách nhận biết

Nạn nhân chảy máu trong thường có các biểu hiện:

- Xanh xao: do mất máu nhiều, nạn nhân/người bệnh có biểu hiện da xanh, niêm mạc nhợt
- Da lạnh, ẩm ướt
- Mạch đập yếu, nhanh
- Đau: có thể đau vật vã, đau quặn từng cơn
- Khát: nạn nhân/người bệnh có cảm giác khát nước
- Bối rối, bồn chồn, cáu giận, có thể dẫn đến ngã quy hay bất tỉnh
- Hỏi nạn nhân/người bệnh có thể biết được về nguyên nhân gây chảy máu trong: những thương tổn, bệnh mới mắc gần đây, bệnh có từ trước có liên quan, hay các loại thuốc đang dùng ...
- Máu chảy từ các lỗ tự nhiên trên cơ thể: quan sát nạn nhân/người bệnh có thể thấy một khối lượng máu chảy ra từ các lỗ tự nhiên.

3.2. Sơ cứu

** Nguyên tắc sơ cứu:*

- Khẩn cấp đưa nạn nhân/người bệnh đến bệnh viện gần nhất để được cứu chữa.
- Phòng và chống (giảm thiểu tối đa) sốc.

** Các bước sơ cứu:*

Bước 1: đỡ nạn nhân nằm xuống ở tư thế thoải mái, đỡ đau, giữ chân họ cao hơn đầu. Nếu nạn nhân bất tỉnh, đặt nạn nhân ở tư thế hồi sức (đầu thấp).

Bước 2: quay điện thoại (số 115) gọi cấp cứu. Giữ ấm cho nạn nhân. Kiểm tra và ghi số đo nhịp thở, mạch đập và mức phản ứng sau mỗi 15 phút.


Bước 3: chú ý ghi nhận số lượng máu, nơi máu chảy ra từ các lỗ trên cơ thể. Nếu có thể, hãy gửi mẫu máu của nạn nhân đến bệnh viện.

4. SƠ CỨU MỘT SỐ VẾT THƯƠNG ĐẶC BIỆT

Có một số vết thương cần thay đổi chút ít về quy tắc nén chung, trực tiếp và gián tiếp, để chữa trị có hiệu quả. Lượng máu mất đi ở các vết thương tại những vùng bị thương đặc biệt có thể là rất nhiều. Do đó nạn nhân phải được theo dõi cẩn thận các dấu hiệu sốc.

4.1. Vết thương ở da đầu

Da đầu được cung cấp máu nhiều, do đó khi bị tổn thương, da đầu nứt ra tạo thành một lỗ lớn. Máu có thể chảy ra nhiều và thường làm cho vết thương



trông có thể nghiêm trọng hơn thực tế, Tuy nhiên, bị thương ở da đầu có thể chỉ là biểu hiện một phần của thương tổn trầm trọng hơn như nứt sọ.

*** Nguyên tắc sơ cứu:**

- Hạn chế sự mất máu
- Đưa nạn nhân đi bệnh viện

*** Các bước sơ cứu:**

Bước 1: mang găng tay dùng 1 lần (nếu có thể), để thay băng da đầu.

Bước 2: đặt miếng gạc vô trùng (nếu có)/sạch lên vết thương rồi nén mạnh trực tiếp rồi băng lại (miếng gạc phải lớn hơn vết thương).

Bước 3: băng chắc vết thương lại, dùng băng hình tam giác, nếu máu vẫn chảy.

Bước 4: đặt nạn nhân còn tỉnh nằm xuống ở tư thế thoải mái, đầu và vai hơi nâng lên. Nếu nạn nhân bất tỉnh, đặt ở tư thế ngửa thẳng đầu thấp.

Bước 5: đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất để được cứu chữa.



Hình 3.13. Vết thương đầu

4.2. Vết thương ở lòng bàn tay

Lòng bàn tay cũng được cung cấp nhiều máu, nên vết thương ở đó có thể gây chảy máu nhiều. Vết thương sâu có thể làm đứt gân và các dây thần kinh, do đó làm mất cảm giác ở các ngón tay.

*** Xử trí sơ cứu:**

Bước 1: ấn miếng băng vô trùng/miếng gạc sạch vào lòng bàn tay và bảo nạn nhân nắm chặt tay lại. Nếu nạn nhân thấy nắm chặt tay quá khó, có thể dùng tay còn lại (tay không bị thương) để bóp nắm tay đó lại.

Bước 2: băng các ngón tay lại để chúng giữ miếng gạc. Xiết chặt mỗi băng trên các ngón tay.

Bước 3: giữ tay nạn nhân đưa lên cao và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

4.3. Vết thương ở khớp

Mạch máu chạy bên trong khuỷu tay và đầu gối thì sát với da, do đó nếu bị đứt, chúng chảy máu rất nhiều. Nên nhớ là kỹ thuật nén động mạch dưới đây sẽ ngăn không cho máu chảy đến các phần thấp hơn của tay hoặc chân.



Hình 3.14. Vết thương bàn tay

*** Sơ cứu:**

Bước 1: đặt miếng gạc trên vết thương. Gập khớp lại càng chặt càng tốt.

Bước 2: giữ khớp gập lại thật chặt để nén lực lên miếng gạc, đồng thời nâng tay hoặc chân bị tổn thương lên, đặt nạn nhân nằm xuống nếu thấy cần thiết.

Bước 3: đưa nạn nhân đến bệnh viện, vẫn để ở tư thế trên. Chú ý thả (nới) lỏng không nén chi tổn thương sau mỗi 10 phút để máu lưu thông lại bình thường nhằm hạn chế tổn thương vùng chi dưới vết thương.

4.4. Vết thương ngực

Dấu hiệu nhận biết: khi nạn nhân có vết thương ngực thường xuất hiện các dấu hiệu, triệu chứng sau:

- Khó thở: nạn nhân thở nhanh, nông và không đều.
- Có thể ho ra máu tươi.
- Đau vùng chấn thương đau tăng khi cử động, khi thở mạnh.
- Nạn nhân hốt hoảng, lo âu, bồn chồn.
- Môi có thể vẫn nóng nhưng da bị tái đi.
- Nạn nhân cảm thấy da ở vùng gần vết thương bị căng, nứt ra (triệu chứng này là do không khí lọt vào trong các mô cơ gây tràn khí dưới da).
- Thấy có máu chảy tràn ra ở miệng vết thương.
- Trong một số trường hợp, không khí đó có thể được hút vào ngực do nạn nhân hít vào làm cho lồng ngực căng ra.



Hình 3.15. Vết thương ngực

*** Nguyên tắc xử trí**

- Băng kín vết thương và tiếp tục duy trì hô hấp đều đặn.
- Hạn chế tối đa khả năng nạn nhân bị sốc.
- Khẩn cấp đưa nạn nhân đi bệnh viện để được cứu chữa kịp thời.

*** Sơ cứu**

- Nếu nạn nhân tỉnh:
 - + Dùng lòng bàn tay của người sơ cứu hoặc của nạn nhân, bịt vào miệng vết thương.
 - + Sau đó dùng gạc sát trùng băng lên vết thương. Bên ngoài miếng gạc là một lớp nhựa cứng rồi dán băng dính hay bó chặt bằng lại để ngăn không cho không khí lọt vào.

- + Đặt nạn nhân nằm/ngồi ở tư thế thoải mái, hơi nghiêng người về phía bên vết thương, động viên an ủi nạn nhân.
- Nếu nạn nhân bất tỉnh: thường xuyên kiểm tra nhịp tim, mạch, huyết áp, nhịp thở cho nạn nhân. Đặt nạn nhân nằm ở tư thế thuận lợi, giữ cho phần không bị thương ở phía trên không bị đè ép để lá phổi lành có thể hô hấp tốt.
- Gọi điện thoại cấp cứu (115) đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

4.5. Vết thương bụng

Vết thương ở bụng rất nguy hiểm, chảy máu nhiều và có thể làm sai lệch vị trí của các cơ quan nội tạng. Ngoài ra, vết thương ở bụng còn có thể gây ra chấn thương hay chảy máu bên trong. Vết thương ở bụng do bị đâm, trúng đạn hay bị đè có thể làm cho các mạch máu bên trong cơ thể bị rách hay bị đứt, do đó rất dễ bị nhiễm trùng.



Hình 3.16. Vết thương ở bụng

* Nguyên tắc sơ cứu:

- Hạn chế tối đa khả năng bị nhiễm trùng.
- Hạn chế khả năng bị sốc.

* Xử trí:

- Cho nạn nhân nằm xuống, đầu gối cao, động viên an ủi nạn nhân.
- Đặt miếng băng/gạc sạch được sát trùng và lớn hơn vết thương băng lên vết thương.
- Nếu nạn nhân bị lòi ruột ra ngoài, người sơ cứu không nên sờ vào ruột mà dùng bông gạc, polyten băng lên để tránh không cho ruột sa xuống nhiều.
- Nếu nạn nhân ho hay nôn mửa, đè mạnh tấm băng vào vết thương để không cho ruột đổ ra ngoài.

- Nếu nạn nhân bất tỉnh, kiểm tra nhịp tim và nhịp thở, cho nạn nhân nghỉ ở tư thế dễ hồi phục để giữ cho cơ bụng thoải mái, không bị căng ra.
- Gọi cấp cứu, nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời.

4.6. Vết thương ở mắt

Đôi mắt có thể bị rách hay bị cắt do bị đánh thẳng vào mắt hoặc mảnh vỡ kim loại, thủy tinh... Bị chấn thương ở mắt là điều đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù chỉ là vết trầy xước nhẹ bên ngoài cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc để lại thương tật, do đó làm thị lực giảm. Vết thương nặng hơn có thể làm vỡ nhãn cầu, chất dịch do đó thoát ra ngoài gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Hình 3.17. Băng mắt cho nạn nhân

* Dấu hiệu nhận biết:

- Đau nhức nhiều ở vùng bị chấn thương, mí mắt bị co giật
- Vết thương trên tròng mắt có thể nhìn thấy được
- Xuất hiện cục máu trên mắt bị chấn thương
- Thị lực bị mất một phần hoặc mất hẳn
- Máu hoặc chất dịch không màu chảy ra ngoài

* Những điều nên làm:

- Ngăn ngừa tối đa những chấn thương phát sinh khác
- Đưa nạn nhân đi bệnh viện

* Cách sơ cứu:

- Đặt nạn nhân nằm ngửa, giữ cố định đầu, nhắm mắt lại vì bất cứ những cử động nào khác của cặp mắt có thể gây ra những chấn thương khác.
- Không được cố lấy những vật lạ còn nằm lại trong mắt.
- Dùng gạc và bông băng chặt cả hai mắt nạn nhân để hạn chế cử động.
- Giữ nguyên tư thế lúc sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.


BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT BĂNG BĂNG BĂNG CUỘN

TT	Nội dung	Có	không
	Chuẩn bị người bệnh		
1	Hướng dẫn người bệnh nằm hoặc ngồi tùy theo tình trạng vết thương		
2	Động viên, giải thích người bệnh yên tâm		
	Chuẩn bị dụng cụ		
3	Cuộn băng bằng vải mềm hoặc vải gạc, băng gạc		
4	Kim băng hoặc móc sắt để cố định băng		
	Kỹ thuật tiến hành		
	BĂNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ		
	* Băng trán		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá phía trên tai		
2	Băng chéo qua phía trước trán, tai, vùng cằm, vòng về trán		
3	Băng như vậy phía trán vòng sau thấp hơn vòng trước, phía gáy vòng sau cao hơn vòng trước		
4	Băng kín vết thương và cố định lại		
	* Băng đầu 2 cuộn (băng vòng gấp lại)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở trán bằng cuộn thứ nhất		
2	Đặt đầu cuộn băng thứ 2 giữa trán đi lên chính giữa đỉnh đầu rồi xuống cằm lật ngược lại băng ra trước và ngược lại toả dần sang 2 bên		
3	Băng cuộn thứ nhất vòng xung quanh trán đè lên cuộn băng 2		
4	Băng kín vết thương và cố định lại trước trán		
	* Băng đầu 1 cuộn		
1	Đặt gạc lên vết thương. Kéo dài cuộn băng và đặt chính giữa đỉnh đầu, một bên đặt phía trước tai, một bên đặt phía sau tai		
2	Gấp cuộn băng ngược lại đến ngang tai, bắt chéo và băng vòng khoá quanh đầu		
3	Bắt chéo băng khi đến ngang tai và băng qua đỉnh đầu sang tai đối diện		
4	Lật ngửa, lật sấp cuộn băng từ phải qua trái và ngược lại toả dần sang 2 bên		
5	Băng kín vết thương cố định lại trước trán		
	* Băng gáy (băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở quanh trán		

TT	Nội dung	Có	không
2	Kéo băng từ trán xuống gáy vòng ra phía trước cổ rồi lại trở về gáy lên trán		
3	Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương cố định lại trước trán		
	* Băng tai		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá quanh trán		
2	Băng từ bướu đỉnh băng chéo xuống dưới tai		
3	Băng vòng sau cao hơn vòng trước ở tai có vết thương		
4	Băng cho đến khi kín tai bị tổn thương, cố định băng		
	* Băng 1 mắt (băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá quanh trán		
2	Băng từ bướu đỉnh qua sống mũi xuống dưới tai vòng ra sau gáy rồi lại lên bướu đỉnh. Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
3	Băng kín vết thương cố định phía trước trán		
	* Băng 2 mắt		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng khoá vòng quanh trán		
2	Băng từ bướu đỉnh qua sống mũi xuống dưới tai vòng ra sau gáy, qua tai đối diện, lên mắt, qua sống mũi, lên bướu đỉnh		
3	Băng như trên vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3 cho đến khi băng kín hai mắt và cố định phía trước trán		
	BĂNG VÙNG CHI TRÊN		
	* Băng vai (băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá sát nách bên vai bị thương		
2	Băng vòng xuống lưng qua nách đối diện, vòng ra trước ngực lên vai và bắt chéo ở vai (với vai trái), với vai phải ngược lại		
3	Băng cao dần lên, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương và cố định ở cánh tay		
	* Băng cánh tay (băng xoắn ốc)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở phía dưới vết thương, băng chéo lên trên vòng ra sau về trước cánh tay		
2	Băng cao dần lên trên vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
3	Băng kín vết thương cố định phía trên vết thương		

TT	Nội dung	Có	không
	* Băng ngực (băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ngay dưới vú, băng chéo lên nách vòng ra sau lưng, lên vai đối diện rồi xuống ngực		
2	Tiếp tục băng vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
3	Băng kín vết thương và cố định dưới vú		
	* Băng khuỷu tay (băng số 8)		
1	Đặt tay ở tư thế cơ năng		
2	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá nếp gấp khuỷu tay		
3	Băng chéo lên trên, vòng ra sau rồi vòng về phía trước khuỷu tay		
4	Băng chéo xuống dưới, vòng ra sau rồi vòng về phía trước, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
5	Băng kín vết thương và cố định ở cánh tay		
	* Băng cẳng tay (kiểu băng chữ nhân gấp lại)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá dưới vết thương		
2	Băng chéo lên trên vòng ra sau về trước rồi chéo xuống dưới, vòng ra sau. Vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
3	Băng kín vết thương, cố định phía trên vết thương		
	* Băng bàn tay		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ngón tay		
2	Băng chéo lên trên, vòng ra sau cổ tay rồi lại vòng xuống dưới		
3	Băng vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương cố định ở cổ tay		
	* Băng ngón tay.		
1	Để sấp bàn tay, băng vòng khoá ở cổ tay		
2	Băng qua mu bàn tay lên gốc ngón tay xa nhất		
3	Băng rắn quấn từ gốc ngón đến đầu ngón, băng xoáy ốc từ đầu ngón về gốc ngón		
4	Băng xuống mu bàn tay về cổ tay và lên gốc ngón khác		
5	Băng đến khi kín các ngón bị thương và cố định lại ở cổ tay		
	BĂNG CHI DƯỚI		
	* Băng ben 1 bên (kiểu băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở đùi sát ben		

TT	Nội dung	Có	không
2	Băng từ phía ngoài đùi chéch qua xương mu đến gai chậu đối diện		
3	Băng vòng sau lưng về gai chậu bên đùi bị thương		
4	Băng xuống dưới vòng qua đùi bắt chéo ở bên, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
5	Băng kín vết thương cố định ở đùi		
	* Băng đùi (kiểu băng xoáy ốc)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở phía dưới vết thương, băng chéch lên trên vòng ra sau đùi, về trước		
2	Băng cao dần lên trên, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 - 2/3		
3	Băng kín vết thương cố định phía trên vết thương		
	* Băng đầu gối (kiểu băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở nếp gấp khoeo chân		
2	Băng chéch lên trên, vòng ra sau rồi vòng về phía trước gối		
3	Băng chéch xuống dưới, vòng ra sau rồi vòng về phía trước, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương và cố định ở đùi		
	* Băng cẳng chân (kiểu băng xoáy ốc)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá phía dưới vết thương		
2	Băng chéch lên trên vòng ra sau rồi về trước		
3	Băng vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương, cố định phía trên vết thương		
	* Băng gót chân (kiểu băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở gót chân		
2	Băng chéch lên trên, vòng ra sau rồi vòng về phía trước cổ chân		
3	Băng chéch xuống dưới, vòng ra sau rồi vòng về phía trước, vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương và cố định ở cổ chân		
	* Băng bàn chân (kiểu băng số 8)		
1	Đặt gạc lên vết thương. Băng vòng khoá ở các ngón chân		
2	Băng chéch lên trên, vòng ra sau cổ chân rồi lại vòng xuống dưới		
3	Băng vòng sau đè lên vòng trước 1/2 hoặc 2/3		
4	Băng kín vết thương cố định ở cổ chân		



TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1. Ba loại băng được dùng trong y tế là băng:
A: Cuộn
B:.....
C:.....
2. Băng vòng là kiểu băng mà các....A..... chồng khít lên vòng....B....
3. Băng rắn quấn là kiểu băng vòng băng sau....A..... vòng băng trước, giữa 2 vòng băng có một ...B..... không có băng.
4. Băng xoáy ốc, vòng băng sau... A... vòng băng trước 1/2 đến 2/3... B...của băng.
5. Băng chữ nhân có 2 kiểu, đó là băng chữ nhân:
A:.....
B:.....
6. Băng số 8 là kiểu băng mà vòng băng sau...A..... và....B..... vòng băng trước 1/2 - 2/3 chiều rộng của băng.
7. Băng vòng gấp lại là kiểu băng có nhiều đường băng cùng....A... và....B.... tại 1 điểm.

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu hỏi sau:

8. Kiểu băng đúng nhất được lựa chọn để băng vết thương ở mặt trước khuỷu tay:
A: Chữ nhân
B: Vòng.
C: Số 8.
D: Cả 3 ý trên.
9. Để băng vết thương vùng đỉnh đầu có thể áp dụng kiểu băng:
A: Vòng
B: Vòng gấp lại.
C: Chữ nhân.
D: Cả 3 ý trên.

10. Để cố định tạm thời xương đòn bị gãy người ta áp dụng kiểu băng:

A: Số 8.

B: Rắn quăn.

C: Vòng.

D: Chữ nhân.

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách đánh dấu (V) vào cột A cho câu đúng cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
11	Khi băng vết thương ở chi cần phải từ ở gốc chi đến ngọn chi		
12	Băng bàn tay phải để hở các đầu ngón cho người bệnh dễ chịu		
13	Có thể sử dụng băng dính to bản để cố định xương sườn bị gãy		
14	Băng vết thương càng băng chặt càng tốt		
15	Sau khi băng vết thương xong phải hỏi người bệnh có cảm giác đau tức ở vùng băng không		
16	Sau băng vết thương nếu có hiện tượng chèn ép thì da thường nóng		

PHÒNG CHỐNG SỐC

MỤC TIÊU

1. *Nêu được khái niệm, đặc điểm, phân loại sốc.*
2. *Trình bày được các triệu chứng chính của sốc.*
3. *Trình bày được nguyên tắc xử trí sốc.*
4. *Trình bày được cách phòng chống sốc ở tuyến y tế cơ sở.*
5. *Rèn luyện được tính khẩn trương, nhẹ nhàng, cẩn thận, chuẩn xác và cảm thông với nạn nhân / người bệnh trong xử trí cấp cứu sốc.*

1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA SỐC

- Sốc là tình trạng suy giảm dòng máu tuần hoàn ở mức độ nặng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên làm rối loạn nghiêm trọng các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Sốc còn được gọi là suy tuần hoàn cấp tính có tỷ lệ tử vong cao.
- Biểu hiện đặc trưng nhất của sốc là:
 - + Giảm huyết áp động mạch: huyết áp động mạch giảm xuống còn thấp hơn hoặc bằng 80 mmHg.
 - + Giảm bài tiết nước tiểu: lượng nước tiểu bài tiết xuống thấp hơn hoặc bằng 20ml/giờ.
- Nguyên nhân gây sốc.
 - + Thứ nhất: khi tim ngừng bơm làm áp suất máu lưu thông trong cơ thể giảm. Nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng bất ổn này là do các bệnh tim.
 - + Thứ hai: khi lưu lượng tuần hoàn trong cơ thể giảm đi. Phổ biến là do xuất huyết nội và chảy máu ngoài da, hoặc mất nước do tiêu chảy nặng, nôn mửa hay bị bỏng nặng. Triệu chứng và biểu hiện chủ yếu của chứng sốc ở nhóm nguyên nhân này liên quan đến việc phân phối lại tuần hoàn máu trong cơ thể.
- Ngất xỉu: là sự mất tỉnh táo trong chốc lát do lượng máu chảy đến não tạm thời bị giảm. Không giống như sốc, mạch đập rất chậm mặc dù

chẳng bao lâu nó sẽ trở lại mức bình thường. Việc hồi phục diễn ra nhanh và hoàn toàn. Ngất xỉu có thể là phản ứng khi bị đau hay sợ sệt hoặc do tức tối, kiệt sức và đói.

2. PHÂN LOẠI SỐC

Căn cứ vào nguyên nhân gây sốc người ta có thể chia ra các loại sốc như sau:

- Sốc do giảm thể tích: do mất máu, mất dịch lưu hành cấp tính như chảy máu, bỏng, nôn, tắc ruột...
- Sốc tim: do nhồi máu cơ tim, nghẽn tắc động mạch phổi cấp tính, chèn ép tim, vỡ phình tắc động mạch chủ, rối loạn nhịp thất nặng, bệnh cơ tim thể giãn...
- Sốc do giãn mạch: hay gặp trong sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc do vi khuẩn Gram (-), vi khuẩn Gram (+) như: tụ cầu khuẩn, vi khuẩn kỵ khí... mà đường vào thường là đường tiết niệu, sinh dục hay tiêu hóa. Sốc do giãn mạch còn gặp trong sốc phản vệ.

3. CÁC TRIỆU CHỨNG CHÍNH CỦA SỐC

3.1. Triệu chứng lâm sàng

Bên cạnh các biểu hiện lâm sàng của căn bệnh chính người ta có thể thấy các triệu chứng sau đây của sốc xuất hiện đột ngột, nhanh chóng, có thể sau vài giờ:

- Da xanh niêm mạc nhợt, lạnh tím đầu chi (bàn tay, chân), vã mồ hôi (riêng trong sốc do giãn mạch da không xanh, có thể đầu chi vẫn còn ấm).
- Thở nhanh nông
- Mạch nhanh, nhỏ, khó bắt mạch quay
- Nghe tim: nhịp tim nhanh, tiếng tim mờ
- Huyết áp tụt và kẹt, huyết áp động mạch tâm thu nhỏ hơn hoặc bằng 80mmHg, có khi không đo được. Với nạn nhân tăng huyết áp, huyết áp tâm thu giảm hơn 25% so với bình thường.
- Số lượng nước tiểu giảm dần có thể dẫn đến thiếu niệu, vô niệu (nhỏ hơn hoặc bằng 20ml/giờ).
- Rối loạn tri giác, nạn nhân/người bệnh có biểu hiện thờ ơ, lơ mơ có khi vật vã kích thích, khát nước trong sốc do giảm thể tích.

3.2. Cận lâm sàng các thăm dò huyết động

Kết quả cận lâm sàng phụ thuộc từng loại sốc khác nhau:


- Sốc giảm thể tích: giảm áp lực tĩnh mạch trung tâm, áp lực động mạch phổi và mao mạch phổi, cung lượng tim, huyết áp động mạch.

- Sốc tim: giảm cung lượng tim và huyết áp động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm và áp lực động mạch phổi.
- Sốc giãn mạch: giảm huyết áp động mạch, áp lực tĩnh mạch trung tâm lúc đầu giảm sau đó có thể tăng, cung lượng tim lúc đầu tăng sau giảm nhiều.

4. NGUYÊN TẮC XỬ TRÍ

4.1. Xử trí ban đầu

- Kê cao chân nạn nhân tạo điều kiện thuận lợi cho máu về tim.
- Ủ ấm cho người bệnh/nạn nhân.
- Làm thông thoáng đường thở: liệu pháp tư thế, hút thông đường hô hấp, đặt ống nội khí quản, mở khí quản.
- Cho nạn nhân thở oxy 6-10 l/phút, nếu cần thì làm hô hấp hỗ trợ qua ống nội khí quản hoặc mở khí quản.
- Đặt dẫn lưu nước tiểu để theo dõi.



Hình 4.1. Xử lý ban đầu nạn nhân bị sốc

4.2. Xử trí tiếp theo tùy theo nguyên nhân gây sốc

- Sốc do giảm thể tích máu: phải điều trị sốc song song với điều trị nguyên nhân để cầm máu và ngừng mất nước.
- Sốc tim: thực hiện y lệnh của bác sĩ về thuốc trợ tim mạch và nâng huyết áp.
- Sốc nhiễm khuẩn: thực hiện y lệnh của bác sĩ truyền dịch, thuốc trợ tim mạch, nâng huyết áp, kháng sinh, cocticoïd...
- Sốc phản vệ: thực hiện y lệnh của bác sĩ để duy trì tuần hoàn, hô hấp và dùng các thuốc chống khó thở, cocticoïd....

4.3. Theo dõi người bệnh/nạn nhân sốc

- Theo dõi dấu hiệu sống
 - + Mạch thường 15 phút/lần, theo dõi liên tục trong những giờ đầu sau đó tùy theo tình trạng người bệnh mà thời gian theo dõi có thể tăng dần 30, 1 giờ, 2 giờ.../lần.

- + Nhiệt độ: trong sốc người bệnh thường hạ thân nhiệt.
- + Huyết áp: cũng như mạch cần phải theo dõi huyết áp động mạch liên tục.
- + Nhịp thở chú ý phát hiện tình trạng suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở nếu có để xử trí kịp thời.




Hình 4.2. Theo dõi mạch nạn nhân

- Theo dõi lượng nước tiểu, các chất dịch, máu của cơ thể bài tiết ra (nếu có) cần phải ghi cụ thể về số lượng, màu sắc tính chất dịch, kịp thời báo cáo cho bác sĩ biết để xử trí kịp thời.

5. PHÒNG VÀ CHỐNG SỐC Ở TUYẾN CƠ SỞ

- Phải nhanh chóng xử trí nạn nhân ngay từ ban đầu khi bị nạn, từ khi dự đoán sẽ có sốc xảy ra, không nên chờ khi huyết áp tụt mới xử trí, cần chống sốc liên tục ngay cả trong lúc vận chuyển, tiến hành ngay việc truyền dịch vào tĩnh mạch.
- Làm tốt 5 kỹ thuật cấp cứu:
 - + Băng bó vết thương, sưởi ấm cho nạn nhân, đặt nạn nhân ở nơi thoáng tránh gió lạnh, nếu nạn nhân uống được (không có chống chỉ định về chuyên môn như thủng tạng rỗng), cho nạn nhân uống nước chè đường nóng. Cố định nhẹ nhàng đúng kỹ thuật, nhất là tại các khớp lớn như khớp háng, khớp vai, tại các nơi có xương lớn bị gãy như xương đùi, xương chậu.
 - + Cầm máu tạm thời phải bằng ép, nếu là vết thương động mạch phải ga rô đúng chỉ định, phải có phiếu ga rô ghi rõ thời gian đặt ga rô, để lộ ga rô ra ngoài hoặc báo cho người tiếp nhận tuyến sâu biết nơi ga rô đúng thời gian quy định. Tránh hoại tử chi do thiếu oxy phải cắt cụt chi do ga rô để quá lâu.
 - + Phòng và chống ngạt thở: để nạn nhân nằm nghiêng đầu, lấy hết đờm dãi, dị vật, nếu lưỡi tụt phải kéo lưỡi ra cố định với cằm, cho thở oxy. Khi có vết thương ngực hở phải bịt kín vết thương ngực hở. Phát hiện sớm những trường hợp vết thương ngực và cấp cứu kịp thời (trong trường hợp cấp cứu dùng kim Pê-trôp cắm vào khoang liên sườn 2 đường giữa đòn để dẫn lưu khí màng phổi).
 - + Tiêm thuốc giảm đau toàn thân morphin, fentanyl, (khi nạn nhân không theo dõi tổn thương nội tạng). Nếu có nghi ngờ tổn thương nội



tạng thì dùng giảm đau tại chỗ tổn thương bằng cách phóng bế lidocain hoặc marcain tại chỗ.

- + Khi nạn nhân ngừng tim: làm tốt việc bóp tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt.
- Nhanh chóng, nhẹ nhàng chuyển nạn nhân về tuyến y tế có khả năng điều trị cho nạn nhân.

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

1. Sốc là tình trạng suy giảm ở mức độ....A...dòng máu tuần hoàn do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên rối loạn nghiêm trọng các quá trình ...B...trong cơ thể.

2. Có 3 nguyên nhân gây nên sốc đó là

A: Giảm thể tích tuần hoàn

B:

C:.....

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu hỏi sau.

3. Trong sốc chỉ số huyết áp động mạch giảm xuống thấp hơn hoặc bằng

A: 70 mmHg

B: 80 mmHg

C: 90 mmHg

D: 100mmHg

4. Trong sốc lượng nước tiểu bài tiết/giờ thấp hơn hoặc bằng

A: 20 ml

B: 30 ml

C: 40 ml

D: 50ml

5. Trong sốc, kiểu thở hay gặp nhất là kiểu

A: thở nhanh



B: thở nhanh nông

C: thở chậm

D: ngừng thở

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (X) vào cột A cho câu đúng, cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
6	Trong sốc da người bệnh có biểu hiện lạnh, vã mồ hôi		
7	Mạch của người bệnh sốc thường mạnh, nhanh		
8	Sơ cứu sốc người ta để người bệnh nằm đầu hơi cao		
9	Sơ cứu sốc người ta phải làm thông thoáng đường thở		
10	Sơ cứu sốc người ta đặt dẫn lưu nước tiểu để lấy nước tiểu xét nghiệm		

SƠ CỨU NGƯỜI BỊ BỎNG

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các nguyên nhân gây bỏng.
2. Trình bày được cách phân độ bỏng, cách tính diện tích bỏng.
3. Nêu được diễn biến của bỏng.
4. Tiến hành sơ cứu được nạn nhân bỏng đúng quy trình kỹ thuật.
5. Thể hiện thái độ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cảm thông với nạn nhân trong quá trình sơ cứu người bị bỏng.

1. NGUYÊN NHÂN GÂY BỎNG

Bỏng là tổn thương da, tổ chức dưới da, phần mềm do nhiều nguyên nhân gây ra:

- Do sức nóng (nước sôi, hơi nóng, lửa...)
- Do hoá chất (acid, base, phospho...)
- Do điện
- Do phóng xạ nguyên tử

2. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỎNG


- Nguyên nhân gây bỏng (bỏng do hoá chất thường nặng hơn bỏng nhiệt)
- Diện tích bỏng (diện tích càng rộng thì càng nặng)
- Độ sâu (bỏng càng sâu thì càng nặng)
- Độ tuổi (trẻ em bị bỏng thường nặng hơn người lớn)
- Bỏng > 15% diện tích cơ thể ở người lớn và > 8% diện tích cơ thể ở trẻ em là bỏng nặng

3. PHÂN LOẠI BỎNG THEO ĐỘ NÔNG SÂU

- Bỏng độ I: là bỏng ở lớp thượng bì, da bị ửng đỏ, đau rát, khi lành không để lại sẹo.



- Bỏng độ II: tổn thương lớp biểu bì, trên nền da đỏ, xuất hiện nốt phỏng sau 1- 2 giờ bị bỏng, các nốt phỏng chứa huyết tương.
- Bỏng độ III: tổn thương toàn bộ các lớp của da, có thể bỏng đến cơ, xương, thần kinh. Khi khỏi để lại sẹo co rúm.



Hình 5.1. Phân loại bỏng theo độ sâu

4. TÍNH DIỆN TÍCH BỎNG: Cách tính diện tích bỏng theo quy luật số 9 của Wallace:

* Người lớn:

- Đầu, mặt cổ: 9%
- Thân phía trước: $9\% \times 2 = 18\%$
- Thân phía sau: $9\% \times 2 = 18\%$
- Một chi trên: 9%
- Một chi dưới: 18%
- Vùng hậu môn sinh dục 1%

* Trẻ em:

Càng nhỏ tỷ lệ đầu, mặt, cổ lớn hơn so với người lớn

- Đầu mặt: 19%
- Một chi dưới: 11%

* Có thể dùng phương pháp tính diện tích bỏng 1 bàn tay của Faust để tính: Cứ 1 bàn tay úp là tính 1%

5. DIỄN BIẾN CÁC GIAI ĐOẠN CỦA BỎNG

5.1. Giai đoạn sốc bỏng: Kéo dài khoảng 48 giờ đầu có 2 thời kỳ

- Thời kỳ sốc thần kinh: diễn ra trong 6 giờ đầu chủ yếu do đau, rất
- Thời kỳ sốc bỏng: sốc do mất máu kéo dài từ 6 – 48 giờ



5.2. Giai đoạn nhiễm độc

Giai đoạn nhiễm độc kéo dài từ ngày thứ 3 đến ngày 15 do cơ thể hấp thụ chất độc của chức hoại tử và nhiễm khuẩn.

Nạn nhân có biểu hiện:

- Toàn thân sốt cao $> 40^{\circ}\text{C}$
- Tiết niệu: ít, nặng có thể vô niệu
- Tiêu hoá: nôn mửa, ỉa lỏng
- Thần kinh: kích thích vật vã, nặng dẫn đến hôn mê

5.3. Giai đoạn nhiễm trùng

Giai đoạn nhiễm trùng từ ngày thứ 11 do hàng rào da bị mất rộng, cơ thể bị suy kiệt, sức đề kháng giảm, vi khuẩn rất dễ xâm nhập. Vi khuẩn hay gặp là tụ cầu trùng vàng và trực khuẩn mủ xanh.

5.4. Giai đoạn phục hồi

Nếu điều trị tốt, các biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc giảm dần, người bệnh ăn uống được, vết bỏng khô dần người bệnh phục hồi.

6. SƠ CỨU NẠN NHÂN BỎNG

6.1. Sơ cứu nạn nhân bỏng do sức nóng

Bỏng do sức nóng gồm hai loại:

- Sức nóng khô (lửa cháy) cháy than, củi, xăng dầu...
- Sức nóng ướt (nước sôi, dầu mỡ sôi, thức ăn nóng...)

* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân

- Loại trừ ngay nguyên nhân gây bỏng.
- Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm ở vị trí bằng phẳng.
- Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí và mức độ bỏng.
- Phòng chống sốc cho nạn nhân.
- Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm.



THƯ VIỆN
HUBI

Hình 5.2. Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn



* Chuẩn bị dụng cụ

- 1 chậu sạch
- thùng hoặc xô nước sạch lạnh
- Khăn hoặc vải mềm
- 1 ca múc nước
- Băng cuộn, gạc
- 1 kéo


* Kỹ thuật tiến hành

- Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo.
- Bỏ ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ.
- Đổ nước vào chậu.
- Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng. Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh một thời gian.
- Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng.
- Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng.
- Đắp khăn, gạc mềm lên vùng bỏng, băng vùng bỏng (băng vừa đủ giữ gạc không băng chặt).
- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị.
- Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.

6.2. Sơ cứu nạn nhân bỏng do acid

* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân

- Loại trừ ngay nguyên nhân gây bỏng.
- Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm ở vị trí bằng phẳng.
- Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí và mức độ bỏng.
- Phòng chống sốc cho nạn nhân.
- Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm.



Hình 5.3. Sơ cứu nạn nhân bỏng hoá chất

*** Chuẩn bị dụng cụ**

- 1 chậu sạch
- Khăn hoặc vải mềm
- 1 thùng hoặc xô nước sạch lạnh
- Dung dịch trung hòa: nước xà phòng, nước vôi trong hoặc natri bicarbonat 1-2%
- 1 ca múc nước
- Băng cuộn, gạc
- 1 kéo


*** Kỹ thuật tiến hành**

- Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo.
- Bỏ bông ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ.
- Đổ nước vào chậu.
- Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng. Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ta ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh một thời gian.
- Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng.
- Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng.
- Đắp khăn, gạc mềm lên vùng bỏng, băng vùng bỏng (băng vừa đủ giữ gạc không băng chặt).
- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị.
- Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.

6.3. Sơ cứu nạn nhân bỏng vôi

*** Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân**

- Loại trừ ngay nguyên nhân gây bỏng.
- Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm ở vị trí bằng phẳng.
- Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí và mức độ bỏng.
- Phòng chống sốc cho nạn nhân.
- Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm.



* Chuẩn bị dụng cụ

- 1 chậu sạch
- 1 thùng hoặc xô nước sạch lạnh
- Dung dịch trung hòa: nước dấm ăn, nước chanh, acid acetic 0,5%...
- Khăn hoặc vải mềm
- 1 ca mức nước
- Băng cuộn, gạc
- 1 kéo



Hình 5.4. Tháo đồ trang sức

* Kỹ thuật tiến hành

- Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo.
- Bỏng ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ.
- Đổ nước vào chậu.
- Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng, rửa đến khi sạch vôi.
- Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh có pha dung dịch trung hòa (nước dấm ăn, nước chanh hoặc acid acetic 0,5%...).
- Những vị trí bỏng không ngâm được vào dung dịch trung hòa, ta dùng khăn, gạc mềm nhúng vào dung dịch trung hòa đắp lên vùng bỏng, băng vùng bỏng.
- Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng.
- Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng.
- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị.
- Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT SƠ CỨU NẠN NHÂN BỎNG DO SỨC NÓNG

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí bỏng, mức độ bỏng		
3	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	1 chậu sạch		
5	1 thùng hoặc xô nước sạch lạnh		
6	Khăn hoặc vải mềm		
7	1 ca múc nước		
8	Băng cuộn, gạc		
9	1 kéo		
	* Kỹ thuật tiến hành		
10	Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo.		
11	Bỏ băng ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ		
12	Đổ nước vào chậu		
13	Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng. Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ta ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh một thời gian.		
14	Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng		
15	Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng		
16	Đắp khăn, gạc mềm lên vùng bỏng, băng vùng bỏng (băng vừa đủ giữ gạc, không băng chặt)		
17	Kiểm tra tình trạng của người bệnh		
18	Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
19	Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT SƠ CỨU NẠN NHÂN BỎNG DO ACID

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí bỏng, mức độ bỏng		
3	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	1 chậu sạch		
5	1 thùng hoặc xô nước sạch lạnh		
6	Dung dịch trung hòa: nước xà phòng, nước vôi trong hoặc natribicarbonat 1 - 2%		
7	Khăn hoặc vải mềm		
8	1 ca múc nước		
9	Băng cuộn, gạc		
10	1 kéo		
	* Kỹ thuật tiến hành		
11	Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo		
12	Bỏ ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ		
13	Đổ nước vào chậu		
14	Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng. Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ta ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh có pha dung dịch trung hòa một thời gian.		
15	Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng		
16	Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng		
17	Đắp khăn, gạc mềm lên vùng bỏng, băng vùng bỏng (băng vừa đủ giữ gạc, không băng chặt)		
18	Kiểm tra tình trạng của người bệnh		
19	Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
20	Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.		



**THƯ VIỆN
HUBT**

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THAM KHẢO NỘI BỘ

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT SƠ CỨU NẠN NHÂN BỎNG VÔI

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí bỏng, mức độ bỏng		
3	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	1 chậu sạch		
5	1 thùng hoặc xô nước sạch lạnh		
6	Dung dịch trung hòa: nước dấm ăn, nước chanh, acid acetic 0,5%...		
7	Khăn hoặc vải mềm		
8	1 ca mức nước		
9	Băng cuộn, gạc		
10	1 kéo		
	* Kỹ thuật tiến hành		
11	Bộc lộ vùng bỏng, nếu quần áo chặt không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân mà dùng kéo cắt bỏ quần áo		
12	Bỏng ở chi nếu có đeo vòng, đeo nhẫn phải tháo bỏ		
13	Đổ nước vào chậu		
14	Dùng khăn hoặc vải mềm rửa nhiều lần tại vùng bỏng. Những vị trí bỏng có thể đặt vào chậu, ngâm vùng bỏng vào chậu nước lạnh một thời gian		
15	Khi ngâm, rửa không làm vỡ nốt phỏng		
16	Không bôi bất cứ thuốc hay chất gì lên vùng bỏng		
17	Đắp khăn, gạc mềm lên vùng bỏng, băng vùng bỏng (băng vừa đủ giữ gạc, không băng chặt)		
18	Kiểm tra tình trạng của người bệnh		
19	Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
20	Khi chuyển nạn nhân phải theo dõi sát phát hiện các dấu hiệu bất thường xảy ra.		

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện các câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

1. Nguyên nhân gây bỏng do..... A..... thường nặng hơn bỏng nhiệt.
2. Bỏng độ I: là bỏng ở lớp.....A....., da bị ứng đỏ, đau rát, khi lành..... B.....
3. Giai đoạn sốc bỏng kéo dài khoảng.....A..... giờ đầu có.....B..... thời kỳ
4. Trong sơ cứu bỏng do kiềm người cứu dùng nước dấm ăn, ngoài ra còn dùng..... A.... hoặc..... B..... pha loãng rửa nhiều lần lên vùng bỏng.

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu sau:

5. Người lớn bỏng bao nhiêu diện tích cơ thể được đánh giá là bỏng nặng
A - Bỏng > 5%
B - Bỏng > 9%
C - Bỏng > 10%
D - Bỏng > 15%
6. Giai đoạn sốc bỏng (thời kỳ sốc thần kinh) diễn ra trong thời gian nào?
A - 2 giờ đầu
B - 4 giờ đầu
C - 6 giờ đầu
D - 8 giờ đầu
7. Dung dịch trung hòa để rửa khi sơ cứu bỏng acid là:
A - Nước muối loãng
B - Nước lạnh
C - Nước vôi trong
D - Nước chanh loãng
8. Việc cần làm ngay khi sơ cứu nạn nhân bỏng do nhiệt
A. Ngâm, rửa vị trí bỏng bằng nước lạnh
B. Đắp lá lên vị trí bỏng
C. Bôi cồn lên vị trí bỏng
D. Bôi mỡ lên vị trí bỏng

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (✓) vào cột A cho đúng, cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
9	Cách tính diện tích bỏng theo quy luật số 9 của Wallace: Bỏng thân trước là 9%		
10	Thời kỳ sốc bỏng kéo dài từ 1 - 2 giờ, tính từ khi nạn nhân bị bỏng		
11	Bỏng độ II: là bỏng làm tổn thương đến lớp cơ		
12	Giai đoạn nhiễm độc do bỏng kéo dài từ ngày từ ngày thứ 3 đến ngày 15		
13	Khi sơ cứu bỏng không cố cởi bỏ quần áo nạn nhân, phải dùng kéo cắt		
14	Khi sơ cứu bỏng phải làm nhẹ nhàng không làm vỡ các nốt phỏng.		

CẦM MÁU - GA RÔ

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các dấu hiệu chảy máu nhiều và cách phân loại chảy máu.
2. Phân biệt được vết thương động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
3. Nêu được nguyên tắc đặt và nới ga rô.
4. Tiến hành băng ép, băng nhồi, băng gấp chi tối đa và ga rô cầm máu đúng quy trình kỹ thuật.
5. Rèn luyện được đức tính nhanh nhẹn, chuẩn xác, cẩn thận trong sơ cứu nạn nhân chảy máu.

Máu là một trong những thành phần quan trọng nhất của các chất nội môi. Khối lượng của máu chiếm 7 - 9% tổng trọng lượng cơ thể. Máu có các chức năng (hô hấp, dinh dưỡng, đào thải, bảo vệ cơ thể, điều nhiệt...). Do một tác nhân nào đó làm tổn thương mạch máu, nhất là tổn thương động mạch, sẽ làm cho khối lượng máu trong cơ thể giảm xuống nhanh chóng. Nếu không được xử trí kịp thời nạn nhân sẽ bị tử vong.

1. DẤU HIỆU MẤT MÁU NHIỀU

Khi người bị mất máu nhiều, có các biểu hiện chính sau:

- Người bệnh hoảng hốt, ý thức lú lẫn, vật vã kích thích hoặc li bì.
- Da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi sờ vào thấy lạnh.
- Mạch nhanh nhỏ, huyết áp hạ.
- Nhịp thở nhanh, nông.
- Có thể quan sát thấy có một khối lượng lớn máu chảy ra bên ngoài.

2. PHÂN LOẠI CHẢY MÁU

* Chảy máu ngoài

Là máu chảy ra từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài cơ thể hoặc nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương ở bên ngoài cơ thể.



*** Chảy máu trong**

Là máu chảy ra từ vết thương ở các cơ quan, bộ phận bên trong cơ thể. Chúng ta có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương.

3. PHÂN LOẠI VẾT THƯƠNG MẠCH MÁU

3.1. Vết thương động mạch

Vết thương động mạch là vết thương mà chúng ta có thể quan sát thấy máu chảy ra từ động mạch khi nó bị tổn thương. Đặc điểm của vết thương động mạch:

- Máu chảy nhiều, phụt thành tia, mạnh lên khi mạch đập.
- Máu màu đỏ tươi (trừ máu động mạch phổi).

3.2. Vết thương tĩnh mạch

Vết thương tĩnh mạch là vết thương mà chúng ta có thể quan sát thấy máu chảy ra từ tĩnh mạch khi nó bị tổn thương. Đặc điểm của vết thương tĩnh mạch:

- Tốc độ chảy máu chậm hơn so với vết thương động mạch. Nếu những tĩnh mạch lớn bị tổn thương máu chảy nhiều trào ra đều ở bề mặt vết thương.
- Màu máu đỏ sẫm (trừ máu tĩnh mạch phổi).

3.3. Vết thương mao mạch

Là vết thương nhỏ, nông do tổn thương cả mao động mạch và mao tĩnh mạch. Đặc điểm của vết thương mao mạch là máu chảy ra số lượng ít, tốc độ rỉ rỉ.


4. SƠ CỨU NẠN NHÂN CHẢY MÁU NGOÀI

Sau khi tai nạn xảy ra.

- Nhanh chóng chuyển nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm theo tư thế phù hợp và thuận lợi.
- Quan sát, đánh giá tình trạng vết thương: tùy theo tình hình cụ thể của vết thương để sử dụng một trong các biện pháp xử trí sau để cầm máu.

4.1. Phương pháp băng ép

- Áp dụng cho các vết thương tĩnh mạch, mao mạch hoặc những vết thương động mạch nhỏ.
- Phương tiện gồm: 2 cuộn băng hoặc 2 mảnh vải sạch cuộn lại, kích thước to nhỏ tùy



Hình 6.1. Băng ép

theo vết thương. Thường dùng băng cuộn hoặc mảnh vải to bản (rộng 6-8cm, dài 1-2m), 1 miếng vải, gạc sạch (vô khuẩn nếu có điều kiện).

- Tiến hành:

- + Đặt một cuộn băng đè lên trên đường đi của mạch máu hoặc lót một miếng gạc rồi đặt trực tiếp lên vết thương.
- + Dùng cuộn băng còn lại để băng ép chặt lại (băng chặt hơn bình thường).

4.2. Phương pháp băng nhồi

- Áp dụng cho các vết thương miệng rộng hoặc vết thương sâu nhưng trong vết thương không còn dị vật (mảnh kim loại hoặc mảnh thủy tinh...).

- Phương tiện:

- + 1 mảnh vải hoặc mảnh gạc dài ngắn tùy theo vết thương.
- + 1 cuộn băng.

- Tiến hành:

- + Làm sạch sơ bộ vết thương (loại bỏ các dị vật nếu có).
- + Nhét mảnh gạc, lấp đầy vào trong lòng vết thương.
- + Lấy băng cuộn băng ép chặt lại.



Hình 6.2. Băng nhồi

4.3. Phương pháp gấp chi tối đa

- Áp dụng: với vết thương mạch máu ở chi như động mạch cánh tay, động mạch cẳng tay, động mạch đùi, động mạch cẳng chân nhưng chi đó không bị gãy.
- Phương tiện:
 - + 1 con chèn bằng gỗ.
 - + 1 cuộn băng.
- Tiến hành:
 - + Đặt con chèn vào nếp gấp khuỷu tay hoặc hõm nách hoặc khoeo chân hoặc nếp bẹn tùy theo vết thương sau đó gấp chi lại.
 - + Dùng cuộn băng băng chặt chi lại theo tư thế vừa gấp.
- Chú ý khi gấp chi:
 - + Gấp cẳng tay vào cánh tay.
 - + Gấp cánh tay vào thân mình.

+ Gấp cẳng chân vào đùi.

+ Gấp đùi vào thân.



Hình 6.3. Gấp chi tối đa

4.4. Phương pháp ga rô cầm máu

Ga rô cầm máu là một biện pháp cầm máu được chỉ định trong các trường hợp sau:

- Vết thương động mạch.
- Trong phẫu thuật hoặc cắt cụt chi.

4.4.1. Nguyên tắc đặt ga rô

- Không đặt dây ga rô trực tiếp lên da nạn nhân.
- Đặt ga rô cách mép vết thương 2cm về phía trên (đối với vết thương nhỏ), 5cm đối với vết thương lớn.
- Không ga rô chặt quá hoặc lỏng quá (chỉ nên ga rô đủ để cầm máu là được).
- Sau 1 giờ phải nới ga rô 1 lần, thời gian 1 lần nới ga rô 1- 2 phút.
- Tổng số thời gian đặt ga rô không quá 6 giờ (tổng số lần nới ga rô là 5 lần).
- Phải luôn luôn theo dõi chi đặt ga rô, không để cho phần chi lạnh (bên dưới vết thương) trong tình trạng thiếu nuôi dưỡng kéo dài.
- Sau khi đặt ga rô xong phải có phiếu ga rô cho nạn nhân, phiếu ga rô phải được ghi rõ ràng đầy đủ các nội dung theo quy định và cài ngay trước ngực nạn nhân.
- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị.
- Nạn nhân đặt ga rô phải được ưu tiên số 1 trong khi vận chuyển và phải có người hộ tống.

4.4.2. Tiến hành

* Ấn động mạch để cầm máu tạm thời

- Trước khi tiến hành ga rô cho nạn nhân trong quá trình chuẩn bị dụng cụ phải có người phụ làm nhiệm vụ ấn động mạch phía trên (đối với vết



thương vùng đầu mặt cổ ấn phía dưới) vùng tổn thương để cầm máu tạm thời.

– Những vị trí ấn động mạch:

- + Nếu tổn thương động mạch cẳng tay, vị trí ấn động mạch ở nếp gấp khuỷu tay (rãnh nhị đầu trong).
- + Nếu tổn thương động mạch cánh tay ấn vào phía trước bờ trong cánh tay.
- + Nếu tổn thương động mạch cẳng chân điểm ấn động mạch là khoeo chân.
- + Trong trường hợp tổn thương động mạch đùi điểm ấn động mạch tạm thời là giữa bẹn.



Hình 6.4. Các vị trí ấn động mạch

* Chuẩn bị dụng cụ đặt ga rô:

– Dụng cụ có chuẩn bị sẵn (dụng cụ đúng quy định).

- + Băng Esmarch là băng cao su to bản:

Chi trên dài 1m, rộng 4cm.

Chi dưới dài 1,5m, rộng 6cm.

- + Một mảnh gạc:

Chi trên dài 30cm, rộng 5cm.

Chi dưới dài 50cm, rộng 7cm.


- + Một băng tam giác hoặc băng cuộn để treo tay nạn nhân sau ga rô (nếu vết thương ở chi trên).

- + Gạc miếng, băng 4 dải.

- + Phiếu ga rô, bút đỏ, kim băng.

- + Hộp cấp cứu, găng tay.

– Dụng cụ tùy ứng: trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng có đầy đủ dụng cụ như trên mà phải tùy theo điều kiện cụ thể nơi xảy ra tai nạn



để chuẩn bị dụng cụ tiến hành ga rô cấp cứu cho nạn nhân, trường hợp này gọi là ga rô tùy ứng:

- + Dùng săm xe đạp rạch đôi hoặc dùng khăn mùi xoa, mảnh vải, băng cuộn để làm dây ga rô, con chèn.
- + 1 que nhỏ dài khoảng 15 – 20cm như: đũa ăn cơm, bút chì, thuốc kẻ...
- + 1 – 2 mảnh vải nhỏ.
- + Hộp cấp cứu, phiếu ga rô, bút đỏ, kim băng (nếu có).

*** Kỹ thuật đặt ga rô**

- Đặt ga rô: có chuẩn bị sẵn sàng ở cơ sở y tế
 - + Người điều dưỡng mang găng tay, đặt nạn nhân ở tư thế thuận lợi.
 - + Quấn mảnh gạc hoặc mảnh vải vòng quanh nơi định đặt ga rô để lót.
 - + Đặt băng Esmarch lên trên vòng gạc rồi băng vòng.
 - + Vòng thứ nhất băng vừa phải, vòng thứ hai chặt hơn vòng thứ nhất, vòng thứ 3 chặt hơn vòng thứ 2, quan sát thấy không có máu chảy ra từ vết thương là được.
 - + Đặt ngón tay cái vào vòng cao su trên động mạch đứt.
 - + Quấn tiếp vòng thứ 4.
 - + Nâng ngón tay cái lên dất phần còn lại của cuộn băng vào vị trí đó để cố định ga rô.
 - + Đặt gạc vào vết thương rồi băng lại.
- Đặt ga rô tùy ứng:
 - + Dùng băng cuộn hoặc khăn mùi xoa vòng quanh nơi định đặt ga rô để lót.
 - + Buộc hơi lỏng dây ga rô lên trên vòng gạc vị trí định đặt ga rô.
 - + Đặt một cuộn băng hoặc một vật tròn (con chèn) để lên đường đi của động mạch.
 - + Một tay luồn que vào vòng dây, một tay đỡ phần dưới của chi kéo căng da.
 - + Tay cầm que bắt đầu xoắn từ từ cho dây chặt lại.
 - + Quan sát vết thương nếu thấy máu ngừng chảy ra là được.
 - + Dùng mảnh vải nhỏ buộc cố định que vào chi.
 - + Đặt gạc vào vết thương rồi băng lại.
- Đối với chi trên dùng băng tam giác hoặc băng cuộn treo tay lên cổ theo tư thế cơ năng.
- Viết phiếu ga rô: dùng mực đỏ, ghi phiếu ga rô đúng, đủ rõ ràng các nội dung trong phiếu theo quy định.

- Cài (cố định) phiếu ga rô đó vào trước ngực nạn nhân.
- Nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân phải theo dõi sát tình trạng sức khỏe của nạn nhân: trạng thái tinh thần, mức độ chảy máu và mất máu.
- Nếu vận chuyển nạn nhân đi xa phải thực hiện đúng quy định nói ga rô.
- Nói ga rô:
 - + Khi đã đủ thời gian quy định phải tiến hành nói ga rô cho nạn nhân.
 - + Rút phần còn lại của cuộn băng cao su hoặc mở dây buộc que ra.
 - + Cầm căng cuộn băng ga rô để cho cuộn băng từ từ lỏng ra. Đối với ga rô tuý ứng thì tháo, xoay que tre từ từ để cho băng ga rô lỏng dần.
 - + Quan sát ngón chi: khi thấy ngón chi hồng trở lại để đúng thời gian quy định.
 - + Ga rô trở lại như ban đầu.
 - + Ghi phiếu ga rô cho nạn nhân.

PHIẾU GA RÔ CẤP CỨU SỐ 1

Họ tên nạn nhân.....Tuổi.....

Vị trí vết thương.....

Tên người đặt ga rô.....

Thời gian đặt ga rô lúc.....giờ..... Ngàythángnăm.....

Nói ga rô lần thứ nhất lúc.....giờ.....

Nói ga rô lần thứ hai lúc.....giờ.....

Nói ga rô lần thứ ba lúc.....giờ.....

Nói ga rô lần thứ tư lúc.....giờ.....

Nói ga rô lần thứ năm lúc.....giờ.....

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT GA RÔ CẮM MÁU

(Dụng cụ có chuẩn bị)

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn và nằm tư thế thuận lợi		
2	Nhận định tình trạng vết thương		
3	Hướng dẫn người phụ ấn phía trên đường đi của động mạch		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật: băng Esmarch (băng cao su), gạc, băng 4 dải, băng tam giác, phiếu ga rô, kim băng, bút đỏ, hộp cấp cứu, găng tay.		
	* Kỹ thuật tiến hành		
5	Người điều dưỡng đi găng, đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy vị trí vết thương và tình trạng nạn nhân.		
6	Quấn gạc lót vòng quanh nơi đặt ga rô trên vết thương 3-5cm		
7	Đặt băng Esmarch (cao su), băng vòng 1 vừa phải, vòng 2 chặt hơn vòng 1, vòng 3 chặt hơn vòng 2.		
8	Đặt một ngón tay vào vòng băng phía trên đường đi của động mạch bị tổn thương, cuộn vòng thứ 4, nâng ngón tay lên dất phần còn lại của cuộn băng vào vị trí đó.		
9	Quan sát vết thương thấy ngừng chảy máu đặt gạc lên vết thương, dùng băng 4 dải băng lại.		
10	Đổi với chi trên dùng băng tam giác treo tay nạn nhân theo tư thế cơ năng.		
11	Viết phiếu ga rô cài trước ngực, chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT GA RÔ CẮM MÁU

(Dụng cụ tùy ứng)

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn, đặt nạn nhân nằm tư thế thuận lợi		
2	Nhận định tình trạng vết thương		
3	Hướng dẫn người phụ ấn tay phía trên đường đi của động mạch		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật: 2 dải băng hoặc khăn mùi xoa, con chèn, que xoắn, vải treo tay, băng vết thương và vải lót ở vị trí đặt ga rô		

TT	Nội dung	Có	Không
5	Hộp thuốc cấp cứu, phiếu ga rô, bút, kim băng (nếu có)		
	* Kỹ thuật tiến hành		
6	Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy vị trí vết thương và tình trạng nạn nhân		
7	Quấn vải lót nơi đặt ga rô phía trên vết thương 3-5 cm		
8	Dùng dải băng hoặc khăn mùi xoa buộc lỏng, đặt con chèn lên đường đi của động mạch		
9	1 tay luồn que xoắn hoặc bút chì vào vòng dây, 1 tay đỡ chi và kéo căng da		
10	Xoắn cho dây chặt dần, quan sát vết thương thấy ngừng chảy máu, cố định que xoắn		
11	Băng vết thương (đối với chi trên treo tay nạn nhân theo tư thế cơ năng)		
12	Viết phiếu ga rô cài trước ngực, chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- Chảy máu ngoài là máu chảy ra từ các cơ quan tổ chứcA... cơ thể.
- Chảy máu trong là máu chảy ra từ các cơ quan, bộ phận ...A... cơ thể.
- Nguyên tắc đặt ga rô quy định: Sau.....A..... giờ phải nới ga rô một lần, thời gian 1 lần nới ga rôB.....
- Có 4 phương pháp sơ cứu chảy máu ngoài là:
A: Băng ép.
B: Băng nhồi.
C:
D:
- Ga rô cầm máu được chỉ định trong các trường hợp:
A: Vết thương động mạch.
B:
- Nạn nhân đặt ga rô phải được...A...trong khi vận chuyển và phải có....B.....



7. Tổng số thời gian đặt ga rô không quá.....A..... giờ.
8. Đặt garô cách mép vết thương.....A..... về phía trên (đối với vết thương nhỏ),.....B..... đối với vết thương lớn.

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu sau:

9. Dấu hiệu quan trọng nhất để nhận biết vết thương động mạch:

- A: Máu chảy nhiều
- B: Máu phụt thành từng tia
- C: Máu tràn đều trên mặt vết thương
- D: Mạch nhanh nhỏ.

10. Loại băng tốt nhất được dùng để ga rô cầm máu là:

- A: Băng vải thô.
- B: Băng tam giác.
- C: Băng cao su.
- D: Cả 3 loại trên

11. Nguyên tắc đặt ga rô quy định: tổng số lần nối ga rô không quá:

- A: 3 lần
- B: 4 lần
- C: 5 lần
- D: 6 lần

12. Nguyên tắc đặt ga rô quy định: thời gian đặt ga rô không quá:

- A: 3 giờ
- B: 4 giờ
- C: 5 giờ
- D: 6 giờ

13. Nguyên tắc đặt ga rô quy định: thời gian nối ga rô trong khoảng từ:

- A: 1- 2 phút
- B: 1- 3 phút
- C: 2- 3 phút
- D: 2- 4 phút



Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (✓) vào cột A cho đúng, cột B cho câu sai.

TT	Nội dung	A	B
14	Nạn nhân mất máu nhiều hoảng hốt, lú lẫn, vật vã kích thích hoặc li bì		
15	Băng nhồi áp dụng cho vết thương miệng rộng hoặc vết thương sâu có dị vật		
16	Băng ép áp dụng cho tất cả các vết thương đều có hiệu quả		
17	Nạn nhân bị vỡ nền sọ ta nhìn thấy máu chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai		
18	Nạn nhân bị mất máu nhiều, khi chăm sóc đặt nằm ngửa, đầu cao nghiêng sang một bên		
19	Khối lượng máu chiếm 10% tổng trọng lượng cơ thể		
20	Máu trong cơ thể có chức năng hô hấp		

CẤP CỨU NGƯỜI BỊ NGỪNG HÔ HẤP - NGỪNG TUẦN HOÀN

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các nguyên nhân gây ngừng thở, ngừng tim.
2. Nêu được triệu chứng của người bị ngừng thở, ngừng tim.
3. Trình bày được nguyên tắc chung khi tiến hành hồi sinh tim phổi.
4. Tiến hành hồi sinh tim phổi đúng quy trình kỹ thuật.
5. Rèn luyện được đức tính khẩn trương, chuẩn mực trong cấp cứu nạn nhân bị ngừng hô hấp, tuần hoàn.

1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NGỪNG THỞ, NGỪNG TIM

- Đuối nước
- Do bị vùi lấp
- Do hít phải khí độc
- Do tắc nghẽn đường hô hấp
- Do tổn thương não, thần kinh
- Do suy hô hấp – suy tim nặng
- Các trường hợp sốc: đa chấn thương, mất máu nhiều

2. TRIỆU CHỨNG CỦA MỘT NGƯỜI BỊ NGỪNG THỞ, NGỪNG TIM

- Lồng ngực, thành bụng bất động
- Nạn nhân nằm yên không cử động
- Sắc mặt trắng nhợt hoặc tím tái
- Sờ vào da giá lạnh
- Tim ngừng đập

3. NGUYÊN TẮC CHUNG KHI XỬ TRÍ CẤP CỨU NẠN NHÂN BỊ NGỪNG THỞ, NGỪNG TIM (HỒI SINH TIM-PHỔI)

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm trên nền cứng, bằng phẳng, thoáng khí.
- Nới rộng quần áo và các dây nịt nịt như: thắt lưng, caravat, áo lót (đối với nữ).
- Làm thông đường hô hấp bằng cách:
 - + Đặt cổ nạn nhân ngửa tối đa, có điều kiện dùng gối kê dưới vai.
 - + Lau sạch đất cát quanh mũi, miệng.
 - + Mở miệng, móc, hút sạch đất, cát, đờm dãi...
- Tiến hành: hồi sinh tim phổi được tiến hành càng sớm càng tốt song phải kiên trì có khi làm 1 - 2 giờ liền.
- Trong quá trình tiến hành hồi sức tim phổi phải theo dõi và đánh giá được tiến triển của nạn nhân.
 - + Tiến triển tốt: hô hấp phục hồi, da đầu chi, môi nạn nhân hồng dần, tim đập trở lại. Tiếp tục sơ cứu đến khi nạn nhân thở đều và sâu.
 - + Tiến triển xấu: hô hấp và tuần hoàn không phục hồi. Da xanh nhợt, đồng tử giãn sau 30 phút không cứu nữa.



Hình 7.1. Nhận định nạn nhân

4. HÔ HẤP NHÂN TẠO

Hô hấp nhân tạo là phương pháp làm cho không khí ở ngoài vào phổi và không khí trong phổi ra ngoài để thay thế cho hô hấp tự nhiên khi nạn nhân bị ngừng thở.

*** Chuẩn bị tư thế người bệnh:** thực hiện các bước như nguyên tắc chung.

*** Chuẩn bị dụng cụ**

- Khay chữ nhật sạch: tìm mở miệng, tìm kéo lưỡi, thanh đè lưỡi, gạc sạch 3 - 4 miếng, bóng Ambu.
- Nếu không có dụng cụ trên ta sử dụng ngay những dụng cụ ở nơi xảy ra tai nạn như: đũa cả, cán thìa, khăn mềm, giấy lau miệng...

*** Kỹ thuật tiến hành**

- Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn



THƯ VIỆN
HUBT

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THAM KHẢO NỘI BỘ

- Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, cổ ngửa tối đa.
- Làm thông đường hô hấp.
- Người cứu quỳ bên vai nạn nhân (có thể đứng ngang vai nếu nạn nhân nằm trên bàn hoặc trên giường).
- Thổi ngạt miệng- miệng

Thổi ngạt miệng- miệng là phương pháp người cứu dùng hơi thở của mình thổi trực tiếp vào miệng của nạn nhân.



Hình 7.2. Thổi ngạt miệng-miệng

- + Một tay luồn dưới cổ nâng cho cổ nạn nhân ngửa tối đa, một tay đặt lòng bàn tay lên trán nạn nhân ngón cái và ngón trỏ để hai bên cánh mũi.
- + Người cứu ngậm miệng hít sâu rồi áp miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh, đồng thời ngón cái ngón trỏ bóp cho cánh mũi nạn nhân kín lại.
- + Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Nếu không thì phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân.
- + Ngẩng lên lấy hơi để thổi lần sau. Đồng thời bỏ tay bịt cánh mũi nạn nhân.
- + Cứ làm như vậy ở những lần sau, tần số người lớn thổi từ 16 – 18 lần/ 1 phút, nạn nhân là trẻ em thổi từ 20 – 25 lần/ 1 phút.
- + Quá trình thực hiện luôn theo dõi đánh giá tình trạng nạn nhân
- Thổi ngạt miệng - mũi (áp dụng khi thổi ngạt đường miệng không hiệu quả)

Thổi ngạt miệng - mũi là phương pháp người cứu dùng hơi thở của mình thổi trực tiếp vào mũi của nạn nhân.

- + Kê gối dưới vai cho cổ nạn nhân ngửa tối đa
- + Người cứu đặt lòng bàn tay lên trán nạn nhân ấn xuống, lòng bàn tay kia đặt dưới cằm nạn nhân.
- + Người cứu ngậm miệng hít sâu rồi áp miệng vào mũi nạn nhân thổi mạnh, đồng thời nâng cằm nạn nhân lên cho miệng kín lại.
- + Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Nếu không thì phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân.
- + Ngẩng lên lấy hơi để thổi lần sau.
- + Cứ làm như vậy ở những lần sau, tần số người lớn thổi từ 16 – 18 lần/ 1 phút, nạn nhân là trẻ em thổi từ 20 – 25 lần/1 phút.
- + Quá trình thực hiện luôn theo dõi đánh giá tình trạng nạn nhân



Hình 7.3. Kỹ thuật thổi ngạt

– Phương pháp bóp bóng Ambu

Đưa một lượng không khí qua bóng Ambu vào phổi nạn nhân bằng cách áp mặt nạ của bóng vào miệng và mũi nạn nhân rồi bóp bóng.

- + Kê gối dưới vai cho cổ nạn nhân ngửa tối đa
- + Người cứu dùng tay hàm dưới nạn nhân lên trên.
- + Đặt mặt nạ áp sát vào miệng, mũi nạn nhân (giữ chặt cho mặt nạ luôn kín).
- + Bóp bóng đồng thời quan sát lồng ngực nạn nhân, khi bóp nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Nếu không thì phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân, hoặc kiểm tra mặt nạ.
- + Bóp bóng tần số: Nạn nhân là người lớn từ 16 – 18 lần/ 1 phút
Nạn nhân là trẻ em từ 20 – 25 lần/ 1 phút.
- + Quá trình thực hiện luôn theo dõi đánh giá tình trạng nạn nhân

5. KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC


Ép tim ngoài lồng ngực là một thủ thuật dùng lực mạnh ép nhịp nhàng lên 1/3 dưới xương ức (tim nằm trong lồng ngực giữa xương ức và cột sống). Khi ép làm thay đổi thể tích trong buồng tim kích thích để tim đập lại, vòng tuần hoàn được phục hồi.

*** Chuẩn bị nạn nhân**

- Cho nạn nhân nằm trên nền cứng.
- Nới rộng quần áo, thắt lưng.


*** Kỹ thuật tiến hành**

- Trước khi ép tim ngoài lồng ngực người cứu đảm vào vùng trước tim nạn nhân 5 cái thật mạnh.
- Người cứu quỳ bên hoặc đứng cạnh nạn nhân.



Hình 7.4. Xác định vị trí ép tim

- Xác định vị trí ép tim:
 - + Người lớn: lấy mũi ức làm mốc đặt ngang 2 ngón tay (trỏ và giữa) phía trên của 2 ngón tay là vị trí ép tim.
 - + Trẻ sơ sinh: kẻ một đoạn nối 2 móm vú, đặt ngón tay lên đường nối ngang qua xương ức. Phía dưới của ngón tay là vị trí ép tim.
- Đặt gốc của 2 bàn tay chồng lên nhau vào đúng vị trí đã xác định.
- Dùng sức mạnh của toàn thân ấn mạnh lên ngực nạn nhân (ấn vuông góc).
- Chùng tay lại cho lồng ngực phồng lên. (không nhấc tay lên)
- Làm như vậy theo tần số 60 – 80 lần/ 1phút.
- Trẻ sơ sinh dùng 2 – 3 đầu ngón tay để ép tần số 100 – 120 lần/ 1 phút.
- Thường xuyên theo dõi sắc mặt, mạch và tình trạng của nạn nhân.



Hình 7.5. Kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực

6. KẾT HỢP KỸ THUẬT THỞ NGẠT VÀ ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC (HỒI SINH TIM PHỔI)

Đây là biện pháp cứu nạn nhân tốt nhất, cùng một lúc người cứu làm cho phổi và tim của nạn nhân hoạt động trở lại.

6.1. Phương pháp một người cứu

- Chuẩn bị nạn nhân:
 - + Cho nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, kê gối dưới vai.
 - + Lấy sạch dị vật trong miệng của nạn nhân.
- Kỹ thuật tiến hành:
 - + Người cứu quỳ bên cạnh nạn nhân (ngang vai).
 - + Thở ngạt 2 lần liên tiếp.
 - + Ép tim 15 lần.



Hình 7.6. Phương pháp một người cứu

6.2. Phương pháp hai người cứu

* Chuẩn bị nạn nhân

- Cho nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, kê gối dưới vai.
- Mở miệng, lau sạch đờm dãi, đất cát trong miệng của nạn nhân.

* Kỹ thuật tiến hành

- Người cứu: 2 người quỳ hoặc đứng đối diện nhau:

+ Người 1: Quỳ ngang cổ (thổi ngạt).

+ Người 2: Quỳ ngang ngực (ép tim). Phối hợp nhịp nhàng.

- Thổi ngạt 1 lần, ép tim 5 lần (kỹ thuật thổi ngạt, ép tim như đã được mô tả ở trên) trong quá trình cứu luôn luôn theo dõi mạch, nhịp thở và đồng tử của nạn nhân.



Hình 7.7. Phương pháp 2 người cứu

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT THỔI NGẠT PHƯƠNG PHÁP MIỆNG - MIỆNG

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng		
3	Quan sát và nhận định tình trạng nạn nhân		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật, hộp thuốc cấp cứu, gối		
5	Kìm mở miệng, đè lưỡi, kẹp kéo lưỡi, gạc, gạc chèn		
	* Kỹ thuật tiến hành		
6	Nới rộng quần áo, kê gối dưới vai		
7	Người cứu quỳ phía đầu nạn nhân, dùng kìm mở miệng		
8	Đặt gạc chèn vào giữa 2 hàm răng phía góc hàm		
9	Đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên, dùng gạc quấn vào ngón tay, móc hết đờm dãi, dị vật trong miệng nạn nhân.		

TT	Nội dung	Có	Không
10	Người cứu quý hoặc đứng ngang vai nạn nhân, 1 tay đặt lên trán ngón trỏ và ngón cái bịt mũi nạn nhân khi thổi vào, 1 tay đặt dưới cằm đẩy ra phía trước, lên trên.		
11	Người cứu ngậm miệng hít sâu rồi áp miệng vào miệng nạn nhân thổi mạnh, quan sát lồng ngực nạn nhân.		
12	Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi, nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Ngực không phồng lên phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân.		
13	Ngắt đầu lấy hơi cho lần thổi sau đồng thời bỏ tay bịt mũi ra		
14	Tần số thổi ngạt: - Nạn nhân người lớn thổi từ 16 – 18 lần/ 1 phút - Nạn nhân là trẻ em thổi từ 20 – 25 lần/ 1 phút.		
15	Quá trình thực hiện luôn theo dõi mạch, nhịp thở, đồng tử của nạn nhân.		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT THỔI NGẠT PHƯƠNG PHÁP MIỆNG - MŨI

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng		
3	Quan sát và nhận định tình trạng nạn nhân		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật, hộp thuốc cấp cứu, gối		
5	Kìm mở miệng, đèn lưỡi, kẹp kéo lưỡi, gạc, gạc chèn		
	* Kỹ thuật tiến hành		
6	Nới rộng quần áo, kê gối dưới vai		
7	Người cứu quý phía đầu nạn nhân, dùng kìm mở miệng		
8	Đặt gạc chèn vào giữa 2 hàm răng phía góc hàm		
9	Người cứu đặt lòng bàn tay lên trán nạn nhân ấn xuống, lòng bàn tay kia đặt dưới cằm nạn nhân.		
10	Đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên, dùng gạc quấn vào ngón tay, móc hết đờm dãi, dị vật trong miệng nạn nhân.		

TT	Nội dung	Có	Không
11	Người cứu ngậm miệng hít sâu rồi áp miệng vào mũi nạn nhân thổi mạnh, đồng thời nâng cằm nạn nhân lên cho miệng kín lại.		
12	Quan sát lồng ngực nạn nhân khi thổi, nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Ngực không phồng lên phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân.		
13	Ngẩng lên lấy hơi để thổi lần sau.		
14	Tần số thổi ngạt: + Nạn nhân người lớn thổi từ 16 – 18 lần/ 1 phút + Nạn nhân là trẻ em thổi từ 20 – 25 lần/ 1 phút.		
15	Quá trình thực hiện luôn theo dõi mạch, nhịp thở, đồng tử của nạn nhân.		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT BÓP BÓNG AMBU

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng		
3	Quan sát và nhận định tình trạng nạn nhân		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật, hộp thuốc cấp cứu, gối		
5	Kim mở miệng, dè lưỡi, kẹp kéo lưỡi, gạc, gạc chèn		
	* Kỹ thuật tiến hành		
6	Nới rộng quần áo, kê gối dưới vai		
7	Người cứu quỳ phía đầu nạn nhân, dùng kim mở miệng		
8	Đặt gạc chèn vào giữa 2 hàm răng phía góc hàm		
9	Đặt đầu nạn nhân nghiêng sang một bên, dùng gạc quấn vào ngón tay, móc hết đờm dãi, dị vật trong miệng nạn nhân.		
10	Người cứu dùng tay hàm dưới nạn nhân lên trên		
11	Đặt mặt nạ áp sát vào miệng, mũi nạn nhân (giữ chặt cho mặt nạ luôn kín).		
12	Bóp bóng đồng thời quan sát lồng ngực nạn nhân, khi bóp nếu lồng ngực phồng lên là không khí đã vào phổi. Nếu không thì phải kiểm tra lại tư thế nạn nhân, hoặc kiểm tra mặt nạ.		
13	Bóp bóng tần số: + Nạn nhân là người lớn từ 16 – 18 lần/ 1 phút + Nạn nhân là trẻ em: thổi từ 20 – 25 lần/ 1 phút		
14	Quá trình thực hiện luôn theo dõi mạch, nhịp thở, đồng tử của nạn nhân.		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT THỐI NGẠT VÀ ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, bằng phẳng		
3	Quan sát và nhận định tình trạng nạn nhân		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
4	Khay chữ nhật, hộp thuốc cấp cứu, gối		
5	Kim mở miệng, đèn lưỡi, kẹp kéo lưỡi, gạc, gạc chèn		
	* Kỹ thuật tiến hành		
	Kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực		
6	Đặt nạn nhân nằm ngửa kê gối dưới vai		
7	Nới rộng quần áo, bộc lộ vùng ngực nạn nhân		
8	Người cứu quỳ ngang ngực bên phải nạn nhân		
9	Đấm vào vùng trước tim nạn nhân 5 cái		
10	Đặt 2 gốc bàn tay chồng lên nhau ở 1/3 dưới xương ức, dùng sức ấn mạnh lên ngực nạn nhân, sau đó chùng tay cho lồng ngực phồng lên (với trẻ em dùng một bàn tay)		
11	Ấn nhịp nhàng như trên với tần số 60 – 80 lần/phút với người lớn, 90 - 100 lần/ phút với trẻ em.		
12	Thường xuyên theo dõi sắc mặt, mạch, đồng tử của nạn nhân		
	Phối hợp thối ngạt và ép tim (Hồi sinh tim phổi)		
	Phương pháp một người		
13	Người cứu quỳ ngang vai nạn nhân, thối ngạt 2 lần, ép tim 15 lần		
	Phương pháp hai người		
14	Một người quỳ ngang ngực bên cạnh bên phải nạn nhân để ép tim		
15	Một người quỳ ngang đầu đối diện người thứ nhất để thối ngạt		
16	Phối hợp nhịp nhàng: thối ngạt 1 lần, ép tim 5 lần		
17	Thường xuyên theo dõi mạch, nhịp thở, đồng tử của nạn nhân		

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

1. Hô hấp nhân tạo là phương pháp làm cho không khí ở ngoài....A.....và không khí ở phổiB.... thay cho hô hấp tự nhiên.
2. Khi nạn nhân bị ngừng thở, ngừng tim quan sát lồng ngực và thành bụng thấy khôngA.....
3. Khi nạn nhân bị ngừng thở, ngừng tim sờ vào da họ có cảm giác...A.....
4. Xác định nạn nhân bị ngừng thở, ngừng tim phải tiến hành hồi sinh tim phổi ngay song phải.....A.....
5. Ép tim ngoài lồng ngực là thủ thuật người cứu dùng lực ép mạnh lên...A... xương ức của nạn nhân.
6. Trong quá trình hồi sinh tim phổi phải theo dõi và đánh giá được.....A....của nạn nhân.

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu sau:

7. Việc làm quan trọng nhất để thổi ngạt cho nạn nhân có hiệu quả:
A: Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
B: Đặt nạn nhân nằm trên nền cứng.
C: Làm thông đường hô hấp.
D: Nói rộng quần áo.
8. Tiến hành hồi sinh tim phổi phương pháp một người cứu thì tỷ lệ giữa thổi ngạt và ép tim là:
A: 2 : 5
B: 2 : 10
C: 2 : 15
D: 2 : 20
9. Khi tiến hành thổi ngạt cho người lớn, người cứu thổi với tần số là:
A: 14 – 16 lần/ 1 phút
B: 16 – 18 lần/ 1 phút
C: 16 – 20 lần/ 1 phút
D: 18 – 20 lần/ 1 phút



10. Khi tiến hành ép tim cho trẻ sơ sinh, người cứu ép với tần số:

A: 100 – 120 lần/ 1 phút

B: 120 – 140 lần/ 1 phút

C: 130 – 150 lần/ 1 phút

D: 140 – 160 lần/ 1 phút

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (✓) vào cột A cho đúng, cột B cho câu sai.

TT	Câu hỏi	A	B
11	Trong khi tiến hành hồi sinh tim phổi người cứu phải đánh giá được tiến triển của nạn nhân.		
12	Khi thổi ngạt người cứu quan sát thấy bụng nạn nhân phồng lên là tốt.		
13	Ép tim ngoài lồng ngực là làm thay đổi thể tích buồng tim		
14	Tần số thổi ngạt cho trẻ em 10 tuổi là 16 – 18 lần/1 phút		
15	Tần số ép tim cho trẻ 10 tuổi là 80 lần/1 phút		
16	Tiến hành hồi sinh tim phổi phải kê gối vào gáy cho nạn nhân.		
17	Hồi sinh tim phổi, phương pháp hai người với tỷ lệ 1 lần thổi ngạt và 5 lần ép tim.		

SƠ CỨU GẦY XƯƠNG

MỤC TIÊU

1. Nêu được nguyên nhân, phân loại và triệu chứng của nạn nhân gãy xương.
2. Trình bày được mục đích, nguyên tắc chung khi sơ cứu gãy xương.
3. Thực hiện được quy trình kỹ thuật sơ cứu nạn nhân gãy xương chi.
4. Rèn luyện được đức tính nhanh nhẹn, khẩn trương, chuẩn xác nhẹ nhàng và cảm thông với nạn nhân trong xử trí sơ cứu gãy xương.

1. NGUYÊN NHÂN GẦY GẦY XƯƠNG

1.1. Gãy xương trực tiếp

Là xương bị gãy do tác nhân trực tiếp vào xương như:

- Bánh xe ô tô, xe máy...đề trực tiếp lên chi hoặc các xương khác.
- Mảnh bom, mảnh đạn phá huỷ xương trực tiếp.
- Cây đổ, gậy đập, đòn gánh đánh trực tiếp vào xương.

1.2. Gãy xương gián tiếp

Là gãy xương ở xa nơi trực tiếp bị thương tổn như:

- Ngã từ trên cao xuống theo tư thế đứng nhưng lại gãy xương cột sống hay gãy xương đùi.
- Ngã chống tay nhưng lại gãy xương lồi cầu cánh tay...

2. PHÂN LOẠI GẦY GẦY XƯƠNG

* Gãy xương kín

Là loại gãy xương mà tổ chức da xung quanh không bị tổn thương (đầu xương gãy không thông ra ngoài, ổ gãy không thông với bên ngoài).

* Gãy xương hở

Là gãy xương mà đầu xương gãy đâm rách da thông với bên ngoài.



3. TRIỆU CHỨNG GÂY XƯƠNG

- Đau: đau ngay sau khi chấn thương xảy ra, điểm đau cố định tại nơi gãy, đau tăng lên khi cử động.
- Sưng nề bầm tím: xảy ra ngay sau chấn thương hoặc sau một vài giờ
- Giảm hoặc mất vận động.
- Biến dạng trục của chi.
- Có tiếng lạo xạo xương gãy.
- Cử động bất thường.

4. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CỐ ĐỊNH GÂY XƯƠNG CHI

4.1. Mục đích

- Làm cho nạn nhân đỡ đau phòng ngừa sốc do chấn thương.
- Giảm bớt nguy cơ làm tổn thương thêm mạch máu, thần kinh, cơ, da do gãy xương gây nên.
- Trong trường hợp gãy hở: cố định gãy xương kết hợp xử trí vết thương phần mềm tốt còn có tác dụng giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết thương.

4.2. Nguyên tắc

- Nẹp được sử dụng để cố định xương gãy phải đủ dài để bất động chắc khớp trên và khớp dưới chỗ gãy.
- Không nên cởi quần áo nạn nhân, khi cần phải bộc lộ vết thương thì cắt quần áo theo đường chỉ (nếu phải cởi thì cởi bên lành trước).
- Không đặt nẹp trực tiếp sát vào da nạn nhân, các chỗ máu lồi của đầu xương phải lót bông rồi mới đặt nẹp.
- Gãy xương kín:
 - + Bất động xương gãy (chi) theo tư thế cơ năng (chi dưới duỗi 180° , chi trên gấp khuỷu 90°).
 - + Cố định nhẹ nhàng, cẩn thận, phải có người phụ kéo nắn chi liên tục cho tới khi cố định xong.
- Gãy hở, gãy nội khớp: phải bất động theo tư thế gãy không kéo nắn, kết hợp xử trí vết thương phần mềm.
- Sau khi cố định xong: đối với chi trên dùng băng tam giác treo lên cổ, chi dưới buộc hai chi vào nhau.

5. DỤNG CỤ ĐỂ CỐ ĐỊNH GÃY XƯƠNG

5.1. Nẹp để cố định

* Nẹp Cramer

Nẹp làm bằng thép. Có hai sợi dọc và nhiều đoạn thép ngang nối với nhau như bậc thang. Nẹp có thể uốn cong theo các vị trí cần thiết. Nẹp dùng để cố định gãy xương cánh tay, cẳng tay, cẳng chân.

* Nẹp cao su

Nẹp làm bằng cao su hai lớp có van để bơm hơi. Kích thước: chi dưới dài 80 cm – 100 cm, chi trên dài 40 cm – 50 cm. Khi dùng luồn nẹp vào chi gãy rồi bơm hơi lên.

* Nẹp gỗ

Thường dùng thanh gỗ bào nhẵn. Kích thước của nẹp, chi trên: dài 40 - 50cm, rộng 5 - 6cm, dày 0,3cm. Chi dưới: dài 80 - 130cm, rộng 8 - 10cm, dày 0,8 cm.

* Nẹp tùy ứng

Có thể dùng tre, luồng, gỗ hoặc các vật liệu có sẵn.

* **Hộp thuốc cấp cứu, cang, phiếu chuyển thương (nếu có).**

5.2. Băng

Dùng băng để lót đầu nẹp hoặc chỗ lồi của đầu xương, tốt nhất là dùng băng mỡ (không thấm nước). Nếu không có có thể dùng băng thấm nước, vải hoặc giấy mềm.

5.3. Băng

Dùng để buộc cố định nẹp, băng rộng bản dài ngắn tùy theo vị trí tổn thương. Băng phải đảm bảo chắc để khi cố định không bị đứt.

6. GÃY XƯƠNG CÁNH TAY

Gãy xương cánh tay thường xảy ra khi nạn nhân ngã chống tay hoặc do gây đập vào... Có thể gãy kín song cũng có trường hợp gãy hở.

Xử trí:

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi theo tư thế thuận lợi.
- Bộc lộ chi bị tổn thương.



Hình 8.1. Cố định gãy xương cánh tay

- Quan sát và đánh giá tình trạng của chi bị tổn thương.

*** Trường hợp gãy hở**

- Băng ép mép vết thương vào đầu xương để cầm máu.
- Đặt một miếng gạc hoặc một miếng vải sạch lên đầu xương chồi ra.
- Đặt một vành khăn hình bán nguyệt bằng vải hoặc bằng bông lên trên vết thương.
- Dùng băng, băng cố định vành khăn hình bán nguyệt lại, băng nhẹ nhàng sao cho vành khăn không ép chặt vào đầu xương.
- Dùng nẹp cố định chi theo tư thế gãy (không kéo nắn).
- Xử trí xong viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân chú ý theo dõi và phòng chống sốc.

*** Trường hợp gãy kín**

- Nếu không có nẹp:
 - + Gấp cẳng tay vuông góc với cánh tay.
 - + Đặt cẳng tay bị tổn thương lên ngực.
 - + Đặt một mảnh vải hoặc băng tam giác giữa tay bị tổn thương và ngực.
 - + Treo tay nạn nhân vào cổ, nếu không có dây treo ta có thể luồn bàn tay nạn nhân qua khe giữa hai cúc áo ngực.
 - + Buộc tay vào ngực bằng một khăn hoặc băng to bản.
- Có nẹp để bất động:
 - + Nạn nhân ngồi: có người phụ đứng ở phía trước 1 tay đỡ cánh tay sát hõm nách, 1 tay đỡ khuỷu tay.
 - + Nạn nhân nằm: cánh tay dạng ra và đưa về phía trước.
 - + Cẳng tay gấp vuông góc với cánh tay.
 - + Kéo nhẹ nhàng, liên tục theo trục của cánh tay.
 - + Người làm chính: đặt 2 nẹp gỗ hoặc nẹp tre, 1 nẹp trên từ xương bả vai đến quá khuỷu tay, 1 nẹp dưới từ hõm nách đến quá khuỷu tay.
 - + Lót bông vào 2 đầu của nẹp sát với đầu xương.
 - + Dùng 2 dải băng to bản buộc cố định: 1 dải trên ổ gầy, 1 dải dưới ổ gầy.
 - + Dùng băng cuộn hoặc băng tam giác treo cẳng tay lên cổ sao cho đúng góc độ và người bệnh thoải mái.
 - + Dùng cuộn băng to bản cố định cánh tay vào thân.
 - + Viết phiếu chuyển thương và chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

7. GÂY XƯƠNG CẰNG TAY

Gãy xương cẳng tay là chấn thương gặp ở mọi lứa tuổi, thường do ngã chống tay hoặc có vật khác đập vào. Xương cẳng tay có thể gãy kín, song cũng có trường hợp gãy hở. Có thể gãy 1 xương hoặc cả 2 xương.

Xử trí:

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt người bệnh nằm hoặc ngồi tùy theo mức độ tổn thương và sức chịu đựng.
- Bộc lộ chi bị tổn thương, quan sát và đánh giá tình trạng chi.

*** Nếu gãy hở**

- Băng ép mép vết thương vào đầu xương để cầm máu.
- Đặt một miếng gạc hoặc một miếng vải sạch lên đầu xương chồi ra.
- Đặt một vành khăn hình bán nguyệt bằng vải hoặc bằng bông lên trên vết thương.
- Dùng băng, băng cố định vành khăn hình bán nguyệt lại, băng nhẹ nhàng sao cho vành khăn không ép chặt vào đầu xương.
- Dùng nẹp cố định chi theo tư thế gãy (không kéo nắn).
- Xử trí xong viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân chú ý theo dõi và phòng chống sốc.

*** Nếu gãy xương kín**

- Trường hợp không có nẹp
 - + Nạn nhân ngồi được: ta có thể dùng băng tam giác to treo cẳng tay trước ngực.
 - + Nếu nạn nhân nằm: đặt tay nạn nhân duỗi thẳng dọc theo thân. Buộc chi bị tổn thương vào cơ thể bằng băng to bản hoặc 3 mảnh vải rộng ở 3 vị trí. Cổ tay cố định vào đùi. Cẳng tay cố định vào bụng. Cánh tay cố định vào ngực.
- Trường hợp có nẹp để bất động.
 - + Nạn nhân gập cẳng tay vuông góc với cánh tay.
 - + Người phụ đứng ở phía trước một tay đỡ khuỷu tay, một tay nắm lấy bàn tay nạn nhân kéo nhẹ theo trục của chi.
 - + Người làm chính đặt nẹp: 1 nẹp từ khớp khuỷu đến hết lòng bàn tay, 1 nẹp từ mỏm khuỷu đến đầu ngón tay.



Hình 8.2. Cố định gãy xương cẳng tay

- + Độn bông vào các đầu nẹp.
- + Dùng băng cuộn để cố định 2 nẹp lại đảm bảo đủ chắc.
- + Dùng băng tam giác hoặc băng treo tay nạn nhân lên cổ.
- + Viết phiếu chuyển thương và đưa nạn nhân đến bệnh viện.

8. GÂY XƯƠNG ĐÙI

- Xương đùi là xương dài nhất cơ thể. Nằm trong khu có nhiều cơ, mạch máu, thần kinh lớn. Mọi tai nạn gây nên gãy xương đùi đều phải được coi là tai nạn nặng nề, nghiêm trọng. Nếu không xử trí kịp thời và đúng kỹ thuật nạn nhân sẽ bị tử vong do sốc chấn thương.
- Gãy xương đùi gặp ở mọi lứa tuổi, song người già và trẻ em tỷ lệ cao hơn.
- Gãy xương đùi thường xảy ra do ngã, do tai nạn giao thông và bom đạn trong chiến tranh..., vì vậy có thể gãy kín hoặc gãy hở.

Xử trí:

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn.
- Đặt nạn nhân nằm ở vị trí bằng phẳng
- Chống sốc cho nạn nhân.
- Bộc lộ vùng bị thương.
- Quan sát đánh giá, xác định vị trí tổn thương.
- Băng cầm máu cho nạn nhân nếu là gãy xương hở gây chảy máu nhiều.

*** Trường hợp không có nẹp**


- Dùng 5 cuộn băng to bản hoặc 5 dải vải to.
- Cố định 2 chân vào nhau, các vị trí cố định như sau: 1 dải trên chỗ gãy, 1 dải dưới chỗ gãy, 1 dải buộc hai đầu gối, 1 dải buộc hai cẳng chân, hai bàn chân bằng số 8.

*** Trường hợp có nẹp (tre, gỗ) để cố định gãy xương.**

Phương pháp hai nẹp

- Cần có 3 người, 1 người làm chính 2 người phụ (cả 3 người đều ngồi theo tư thế chân quỳ, chân chống).
- + Người phụ thứ nhất ngồi phía dưới chân tổn thương của nạn nhân: một tay đỡ gót chân nạn nhân và kéo theo trục của chi. Một tay nắm bàn chân nạn nhân hơi đẩy ngược về phía đùi sao cho bàn chân vuông góc với cẳng chân. Mắt luôn quan sát sắc mặt nạn nhân.
- + Người phụ thứ hai ngồi phía bên chi lành luôn tay nâng chi hoặc người nạn nhân và giữ nẹp.
- + Người thứ ba (người làm chính) đặt 2 nẹp: nẹp ngoài từ hõm nách đến, quá gót. Nẹp trong từ bẹn đến quá gót.

- + Đệm bông, vải mềm hoặc giấy mềm vào đầu nẹp và máu lồi của xương cả phía trong và phía ngoài.
- + Luồn các dải băng để cố định: 1 dải trên chỗ gãy, 1 dải dưới chỗ gãy, 1 dải dưới khớp gối, 1 dải ở 1/3 dưới cẳng chân, 1 dải ngang 2 mào chậu, 1 dải ngang ngực. Băng số 8 để giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân.
- + 3 dải còn lại dùng để cố định 2 chi vào nhau: 1 dải sát 2 cổ chân, 1 dải chính giữa hai gối, 1 dải sát hai bên bẹn.
- Sau khi cố định xong kiểm tra tuần hoàn của chi, viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân chú ý theo dõi và đề phòng sốc.



Hình 8.3. Cố định gãy xương đùi

Phương pháp ba nẹp

- Hai người phụ quý sát bên cạnh nạn nhân giúp nạn nhân nằm hơi nghiêng sang bên lành.
- Người làm chính:
 - + Đặt nẹp thứ nhất từ sau xương bả vai đến quá gót chân (sau khi đặt nẹp xong hai người phụ giúp nạn nhân nằm lại tư thế ban đầu).
 - + Đặt nẹp thứ hai từ hõm nách đến quá gót chân.
 - + Đặt nẹp thứ ba từ bẹn đến quá gót chân.
- Nhiệm vụ của hai người phụ giống như trong phương pháp hai nẹp.
- Độn bông hoặc giấy mềm, vải mềm vào đầu nẹp và máu lồi của xương.
- Buộc các dải băng cố định: 1 dải trên ổ gãy, 1 dải dưới ổ gãy, 1 dải dưới khớp gối, 1 dải 1/3 dưới cẳng chân, 1 dải ngang hai mào chậu, 1 dải ngang ngực. Băng số 8 để giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân.
- Sau khi cố định xong kiểm tra tuần hoàn của chi và tình trạng nạn nhân, viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển phải theo dõi và đề phòng sốc.

9. GÂY XƯƠNG CẰNG CHÂN


Cẳng chân có hai xương: xương chày và xương mác. Có thể gãy một trong hai xương hoặc gãy cả hai xương. Có thể gãy kín hoặc gãy hở. Song nếu gãy một xương thì gãy xương chày diễn biến và xử trí phức tạp hơn gãy xương mác. Gãy xương cẳng chân thường do ngã, do tai nạn hoặc vật nặng đè vào.

* Trường hợp gãy xương hở

- Băng ép mép vết thương vào đầu xương để cầm máu.
- Đặt một miếng gạc hoặc một miếng vải sạch lên đầu xương chồi ra.
- Đặt một vành khăn hình bán nguyệt bằng vải hoặc bằng bông lên trên vết thương.
- Dùng băng, băng cố định vành khăn hình bán nguyệt lại, băng nhẹ nhàng sao cho vành khăn không ép chặt vào đầu xương.
- Dùng nẹp cố định chi theo tư thế gãy (không kéo nắn).
- Xử trí xong viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện.
- Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân chú ý theo dõi và phòng chống sốc.

* Trường hợp gãy kín

- Không có nẹp cố định: chuẩn bị 4 dải băng to bản, 4 mảnh vải. Cố định 2 chi vào nhau ở các vị trí: 1 dải trên ổ gãy, 1 dải dưới ổ gãy, 1 dải cố định đùi, 1 dải cố định 2 bàn chân theo kiểu băng số 8.
- Cố định cẳng chân bằng nẹp tre hoặc nẹp gỗ. Cần phải có 3 người (cả 3 người đều ngồi tư thế chân quỳ, chân chống).
 - + Người thứ nhất: ngồi phía bàn chân nạn nhân: một tay đỡ gót chân và kéo theo trục của chi, một tay nắm bàn chân nạn nhân hơi đẩy về phía đùi sao cho bàn chân vuông góc với cẳng chân, mắt luôn luôn quan sát sắc mặt của nạn nhân.
 - + Người thứ hai: ngồi bên nạn nhân (phía bên lành), luôn 2 tay nâng chi nạn nhân khi luồn dây cố định.
 - + Người làm chính: đặt 2 nẹp (nẹp trong từ giữa đùi đến quá gót, nẹp ngoài từ giữa đùi đến quá gót, độn bông, vải mềm hoặc giấy mềm vào đầu nẹp và các đầu xương cả hai phía trong và ngoài của chi. Buộc các dải băng cố định: 1 dải trên ổ gãy, 1 dải dưới ổ gãy, 1 dải trên khớp gối khoảng 3 – 5cm. Băng số 8 sát cổ chân để giữ bàn chân vuông góc với cẳng chân, 2 dải còn lại để cố định 2 chi vào nhau: 1 dải sát cổ chân, 1 dải chính giữa gối. Sau khi cố định xong viết phiếu chuyển thương và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế. Trong quá trình xử trí và vận chuyển nạn nhân chú ý theo dõi và đề phòng chống sốc.



Hình 8.4. Cố định gãy xương cẳng chân

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH Gãy KÍN XƯƠNG CẢNH TAY

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy theo tình trạng sức khỏe		
3	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí xương gãy		
4	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
5	Hai nẹp bằng gỗ: - Nẹp trên dài từ quá vai đến quá khuỷu tay - Nẹp dưới dài từ hố nách đến quá nếp gấp khuỷu tay		
6	2 dải băng to bản, 1 cuộn băng, 1 băng tam giác Hộp cấp cứu, bông không thấm nước phiếu chuyển thương		
7	* Kỹ thuật tiến hành		
8	Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy theo tình trạng, để cẳng tay vuông góc với cánh tay, tay lành đỡ lấy tay đau		
9	Hướng dẫn người phụ: đứng đối diện với nạn nhân, 1 tay đặt ở khuỷu, 1 tay đặt ở hố nách, vừa kéo vừa quan sát nạn nhân		
10	Đặt nẹp trên từ quá vai đến quá khuỷu tay		
11	Đặt nẹp dưới từ hố nách đến quá khuỷu tay		
12	Đệm bông không thấm nước ở khuỷu, vai, hố nách		
13	Đặt dải băng trên ổ gãy, dưới ổ gãy và cố định		
14	Treo cẳng tay trước ngực bằng băng tam giác		
13	Cố định tay với thân mình bằng cuộn băng		
15	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi, viết phiếu chuyển thương		
16	Chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
17	Quá trình chuyển phải theo dõi sát tình trạng của nạn nhân		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH GỠ KÍN XƯƠNG CẰNG TAY

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy theo tình trạng sức khỏe		
3	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí xương gãy		
4	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
5	Hai nẹp bằng gỗ: - Nẹp ngoài dài từ quá khuỷu tay đến đầu ngón tay - Nẹp trong dài từ nếp gấp khuỷu tay đến lòng bàn tay		
6	3 dải băng to bản, 1 cuộn băng, 1 băng tam giác		
	Hộp cấp cứu, bông không thấm nước, phiếu chuyển thương		
7	* Kỹ thuật tiến hành		
8	Đặt nạn nhân nằm hoặc ngồi tùy theo tình trạng, để cẳng tay vuông góc với cánh tay, tay lành đỡ lấy tay đau.		
9	Hướng dẫn người phụ: đứng đối diện chi gãy, 1 tay đỡ khuỷu, 1 tay đỡ cổ tay, vừa kéo vừa quan sát nạn nhân		
10	Đặt nẹp ngoài từ quá khuỷu đến đầu ngón tay		
11	Đặt nẹp trong từ nếp gấp khuỷu đến hết lòng bàn tay		
12	Đệm bông khuỷu tay, cổ tay		
13	Đặt dải băng trên ổ gãy, dưới ổ gãy và ở bàn tay, cố định		
14	Treo cẳng tay trước ngực bằng băng tam giác		
15	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi, viết phiếu chuyển thương		
16	Chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
17	Quá trình chuyển phải theo dõi sát tình trạng của nạn nhân		

BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH GÂY KÍN XƯƠNG ĐÙI (Phương pháp hai nẹp)

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên vị trí bằng phẳng		
3	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí xương gãy		
4	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
5	Hai nẹp bằng gỗ: - Nẹp ngoài dài từ hõm nách đến quá gót chân - Nẹp trong dài từ bẹn đến quá gót chân		
6	9 dải băng to bản, 1 cuộn băng, bông không thấm nước		
7	Hộp dụng cụ và thuốc cấp cứu, cang, phiếu chuyển thương		
	* Kỹ thuật tiến hành		
8	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên vị trí bằng phẳng, chân hơi dẹt		
9	Hướng dẫn người phụ một: ngồi dưới chân nạn nhân, 1 chân quỳ, 1 chân chống, 1 tay đỡ gót, 1 tay đẩy bàn chân vuông góc với cẳng chân động thời kéo chi liên tục		
10	Hướng dẫn người phụ hai: ngồi bên chi lành, nâng đỡ chi nạn nhân và giữ nẹp		
11	Đặt nẹp ngoài từ hõm nách đến quá gót chân		
12	Đặt nẹp trong từ bẹn đến quá gót chân		
13	Đệm bông không thấm nước: hõm nách, bẹn, đầu gối, mắt cá chân		
14	Đặt dải băng trên- dưới ổ gãy, dưới khớp gối, cổ chân, ngang 2 mào chậu và ngang ngực rồi cố định.		
15	Dùng cuộn băng, băng bàn chân vuông góc với cẳng chân		
16	Đặt dải băng ở 1/3 trên đùi, ngang 2 khớp gối, 1/3 dưới cẳng chân và cố định		
17	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi, viết phiếu chuyển thương		
18	Chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
19	Quá trình chuyển phải theo dõi sát tình trạng của nạn nhân		



BẢNG KIỂM: KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH GÂY KÍN XƯƠNG CẰNG CHÂN

TT	Nội dung	Có	Không
	* Tiếp nhận và nhận định tình trạng nạn nhân		
1	Đưa nạn nhân ra khỏi nơi bị nạn		
2	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên vị trí bằng phẳng		
3	Nhận định toàn trạng nạn nhân và xác định vị trí xương gãy		
4	Giải thích, động viên nạn nhân hoặc người nhà yên tâm về thủ thuật sắp làm		
	* Chuẩn bị dụng cụ		
5	Hai nẹp bằng gỗ dài từ giữa đùi đến quá gót chân		
6	5 dải băng to bản, 1 cuộn băng, bông không thấm nước		
7	Hộp thuốc cấp cứu, cáng, phiếu chuyển thương		
	* Kỹ thuật tiến hành		
8	Đặt nạn nhân nằm ngửa trên vị trí bằng phẳng, chân hơi dẹt		
9	Hướng dẫn người phụ một: ngồi dưới chân nạn nhân, 1 chân quỳ, 1 chân chống, 1 tay đỡ gót, 1 tay đẩy bàn chân vuông góc với cẳng chân đồng thời kéo chi liên tục.		
10	Hướng dẫn người phụ hai: ngồi bên chi lành, giữ nẹp và nâng đỡ chi gãy của nạn nhân.		
11	Đặt nẹp ngoài, trong từ giữa xương đùi đến quá gót chân		
12	Đệm bông không thấm nước: đầu gối, mắt cá chân		
13	Đặt dải băng trên- dưới ổ gãy và trên khớp gối, cố định		
14	Dùng cuộn băng, băng bàn chân vuông góc với cẳng chân		
15	Đặt dải băng ngang 2 gối, 2 cổ chân và cố định		
16	Kiểm tra tuần hoàn đầu chi, viết phiếu chuyển thương		
17	Chuyển nạn nhân đến cơ sở điều trị		
18	Quá trình chuyển phải theo dõi sát tình trạng của nạn nhân		

TỰ LƯỢNG GIÁ

Hoàn thiện câu sau bằng cách chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

1. Hai nguyên nhân gây gãy xương là gãy xương:

A:.....

B:.....

2. Có hai loại gãy xương: Gãy xương.....A.....và gãy xương.....B.....



3. Mục đích của cố định gãy xương là làm cho nạn nhân..... A..... phòng ngừa sốc.

4. Mục đích của cố định gãy xương là làm giảm nguy cơ gây...A..... thêm mạch máu, thần kinh, cơ, da.

5. Gãy xương hở là loại gãy xương mà.....A.....làm rách da thông với bên ngoài.

Chọn ý đúng nhất để trả lời cho các câu sau:

6. Tư thế cơ năng của chi trên có góc độ là:

A: 45^0

B: 60^0

C: 90^0

D: 180^0

7. Tư thế cơ năng của chi dưới có góc độ là:

A: 90^0

B: 120^0

C: 160^0

D: 180^0

8. Khi nạn nhân gãy xương đùi người điều dưỡng phải làm ngay:

A: Phòng chống sốc.

B: Theo dõi tuần hoàn đầu chi.

C: Xác định vị trí gãy.

D: Chuẩn bị phương tiện cố định.

Phân biệt đúng, sai các câu sau bằng cách điền dấu (✓) vào cột A cho đúng, cột B cho câu sai.

STT	Nội dung	A	B
9	Điểm đau chói là dấu hiệu quan trọng khi khám cho nạn nhân bị gãy xương		
10	Người bị gãy xương ở chi có triệu chứng giảm hoặc mất vận động		
11	Khi chi bị gãy xương ta thấy dài hơn chi lành		
12	Khi cố định cho người gãy xương hở, phải cố định theo tư thế cơ năng		
13	Khi cố định cho người gãy xương kín, phải cố định theo tư thế gãy		
14	Nạn nhân gãy xương cẳng chân, khi sơ cứu không có nẹp ta có thể dùng gang tơ bản buộc chi gãy vào chi lành		


VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN

MỤC TIÊU

1. *Nêu được các nguyên tắc khi vận chuyển nạn nhân.*
2. *Thực hiện được một số kỹ thuật vận chuyển nạn nhân bằng phương pháp một người và hai người.*
3. *Rèn luyện đức tính khẩn trương, cẩn thận, chính xác, cảm thông và tôn trọng người bị nạn trong quá trình vận chuyển.*

1. NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN

- Không được di chuyển nạn nhân trừ khi thật sự cần thiết. Không được làm nguy hại đến sự an toàn họ.
- Giải thích cho nạn nhân biết lý do việc phải di chuyển để nạn nhân yên tâm và phối hợp hành động được tốt (nếu có thể).
- Di chuyển nạn nhân cần phải có người trợ giúp, người trợ giúp phải có kiến thức hoặc phải hiểu được những gì họ phải làm để có thể phối hợp nhịp nhàng, đầy đủ và hiệu quả.
- Trong trường hợp có nhiều người cùng tham gia di chuyển nạn nhân, cần phải có một người chỉ đạo hướng dẫn các việc bằng lời nói mà thôi.
- Vận chuyển nạn nhân phải đúng kỹ thuật để tránh cho người vận chuyển khỏi bị tai nạn, tổn thương cột sống khi khiêng, vác nạn nhân.



2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN

2.1. Trường hợp chỉ có một người cứu

2.1.1. Phương pháp nâng người

- Người làm nhiệm vụ vận chuyển đứng bên cạnh nạn nhân, dìu nạn nhân đứng dậy, nắm chặt tay nạn nhân và choàng sang cổ.

Hình 9.1. Phương pháp nâng người

- Quàng tay còn lại sang eo (hông) bên kia của nạn nhân và nắm thật chặt quần áo ngay chỗ đó để giữ nạn nhân thẳng người trong lúc di chuyển.
- Chân phía bên nạn nhân tiến lên một bước, di chuyển từng bước nhỏ và theo nhịp phù hợp với sải chân của nạn nhân. Trong trường hợp đó, nếu có thể, nên dùng gậy chống để giúp nạn nhân vững hơn. Luôn tìm cách động viên an ủi nạn nhân.

2.1.2. Phương pháp ẵm

- Ngồi xổm bên cạnh nạn nhân và choàng một tay quanh eo (hông) nạn nhân.
- Luồn tay kia dưới chân, ngang đầu gối nạn nhân và nâng lên.



Hình 9.2. Phương pháp ẵm

2.1.3. Phương pháp kéo

- Người vận chuyển ngồi sau lưng nạn nhân và đặt hai tay nạn nhân ra trước ngực.
- Luồn hai tay vào hai bên nách nạn nhân và kéo đi.

Trường hợp nạn nhân đang mặc áo jacket, cởi nút áo ra và kéo cao lên ngang vai để kéo đi.



Hình 9.3. Phương pháp kéo

2.1.4. Phương pháp công

- Ngồi trước mặt và xoay lưng vào nạn nhân, để nạn nhân tự ôm cổ.
- Hai tay bạn giữ chặt vào đùi nạn nhân rồi đứng lên từ từ sao cho lưng người vận chuyển vẫn thẳng.



Hình 9.4. Phương pháp công

2.2. Trường hợp có hai người cứu

2.2.1. Di chuyển nạn bằng phương pháp nạn nhân ngồi trên hai tay bắt chéo

- Hai người vận chuyển ngồi xổm hai bên nạn nhân, bắt chéo tay sau lưng và nắm lấy thắt lưng quần của nạn nhân.
- Luồn tay kia phía dưới đầu gối nạn nhân, người này nắm lấy cổ tay người kia.
- Ôm chặt người nạn nhân, cùng nâng lên và di chuyển chậm, nhẹ nhàng, sao cho lưng người vận chuyển vẫn thẳng.



Hình 9.5. Di chuyển nạn nhân

2.2.2. Phương pháp di chuyển nạn nhân bằng cáng

* Nguyên tắc chung khi sử dụng cáng

- Kiểm tra cáng cứu thương trước khi sử dụng.
- Đảm bảo cáng cứu thương phải có khả năng chịu nổi trọng lượng của nạn nhân.
- Giải thích cho nạn nhân những vấn đề có thể xảy ra khi khiêng cáng để họ yên tâm và phối hợp với người vận chuyển (nếu có thể) trước khi đặt nạn nhân lên cáng.
- Khi nạn nhân bất tỉnh hoặc nếu cần di chuyển đi xa trên cáng, nên cố định buộc kỹ nạn nhân vào cáng cứu thương.

* Phân loại cáng

- Cáng cứu thương đạt tiêu chuẩn: Furley và Utila là nhãn hiệu của những cáng cứu thương đạt tiêu chuẩn chất lượng.

+ Cáng cứu thương hiệu Furley:

Loại cáng cứu thương này gấp lại được theo chiều ngang để cất đi. Tấm vải bạt được gấp lại phía trên cáng.



Hình 9.6. Cáng Furley

+ Cáng cứu thương hiệu Utila:

Loại cáng cứu thương này được gấp gọn hơn loại cáng hiệu Furley, hai cáng có khớp nối nên có thể gấp lại theo chiều dọc. Các tay nắm cũng được thu lại gọn gàng.



Hình 9.7. Cáng Utila

- Cáng cứu thương tự tạo

+ Cáng cứu thương rời:

Là loại cáng gồm một miếng vải bạt và hai cây khiêng, thường dùng để chuyển nạn nhân một quãng ngắn như sang một cáng khác hoặc ra xe cứu thương. Miếng vải bạt có móc và hai lỗ bên để luồn cáng khiêng vào. Khoảng giữa có những giá đỡ làm cho cáng chắc chắn hơn.


+ Cáng cứu thương giả:

Trong những trường hợp cần thiết, không có dụng cụ và nạn nhân cần được di chuyển kịp thời, bạn có thể thay thế cáng bằng một cánh cửa, bảng quảng cáo. Ngoài ra, có thể dùng hai thanh khiêng, tạm luồn vào tay áo lộn ngược vào trong để thay thế cáng cứu thương.

*** Chuẩn bị cáng (cáng đạt tiêu chuẩn)**

– Cách mở cáng:


- + Đặt cáng nghiêng sang một bên, tháo dây cột và mở chân cáng ra.
- + Dùng chân đẩy thanh ngang bên ra ngoài.
- + Dựng đứng cáng lên và ấn mạnh xuống thanh ngang còn lại để mở ra.
- + Chú ý: Nếu cả hai thanh ngang quay vào trong, dựng đứng thanh ngang dậy, dùng chân đạp mạnh vào.



Hình 9.8. Cách mở cáng

– Cách gấp (xếp) cáng:

- + Để cáng cứu thương nghiêng sang một bên, dùng chân ấn mạnh vào bản lề của thanh ngang.
- + Gập hai đầu cáng lại và cột gọn gàng.



Hình 9.9. Cách xếp cáng

*** Đặt nạn nhân lên cáng**

- Cần phải có người phụ giúp (lý tưởng 5 người) nhẹ nhàng nghiêng nạn nhân sang một bên.
- Đặt cáng sát lưng rồi đồng thời lật nạn nhân nằm ngửa trên cáng an toàn.
- Chú ý:



- + Có thể dùng cánh rời, dùng chèn hoặc dùng cách khiêng trực tiếp để khiêng người bệnh. Không được khiêng nạn nhân nếu nghi ngờ bị gãy xương cột sống.
- + Trường hợp khẩn cấp cần di chuyển nạn nhân khỏi nơi nguy hiểm ngay thì phải giữ đầu, thân người và chân nạn nhân thẳng hàng.

*** Cách khiêng cánh**

- Nguyên tắc chung là khiêng chân nạn nhân lên trước (trừ trường hợp đặc biệt)
- Kỹ thuật khiêng cánh:
 - + Bốn người đứng ở tay cầm, nếu chỉ có ba người thì hai người ở đầu, một người ở cuối cánh.
 - + Khi có hiệu lệnh tất cả cùng nâng cánh lên và giữ sao cho người nạn nhân thẳng bằng.
 - + Người khiêng cánh bước đầu tiên bằng chân phía bên cánh và bước ngắn chậm.
 - + Khi có hiệu lệnh những người khiêng cùng ngồi xổm xuống rồi hạ cánh.



Hình 9.10. Kỹ thuật khiêng cánh

BẢNG KIỂM: PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN
(Phương pháp một người)

TT	Nội dung	Có	Không
PHƯƠNG PHÁP NẠNG NGƯỜI			
1	Đứng cạnh nạn nhân, đỡ nạn nhân đứng dậy		
2	Nắm chặt tay nạn nhân và choàng qua cổ nạn nhân		
3	Quàng tay còn lại sang eo (hông) bên kia của nạn nhân và nắm chặt quần áo ngay chỗ đó để giữ nạn nhân thẳng người trong lúc di chuyển		
4	Tiến lên phía trước (bước đầu tiên) bằng chân phía bên nạn nhân. Di chuyển từng bước nhỏ và theo nhịp phù hợp với sải chân của nạn nhân		
5	Kết hợp vừa di chuyển nạn nhân vừa động viên an ủi và quan sát toàn trạng nạn nhân.		
PHƯƠNG PHÁP ẨM			
1	Ngồi xổm bên cạnh nạn nhân và choàng một tay quanh eo ngang hông nạn nhân		
2	Luồn tay kia dưới chân, ngang đầu gối nạn nhân và nâng lên		
3	Di chuyển nạn nhân nhẹ nhàng, hạn chế đau đớn		
PHƯƠNG PHÁP KÉO			
1	Ngồi sau lưng nạn nhân và đặt hai tay nạn nhân ra trước ngực		
2	Luồn hai tay vào hai bên nách nạn nhân (nếu nạn nhân mặc áo jacket, cởi nút áo ra cho nạn nhân và kéo cao lên ngang vai).		
3	Kéo nạn nhân đi nhẹ nhàng hạn chế đau đớn thêm cho nạn nhân.		
PHƯƠNG PHÁP CÔNG			
1	Ngồi trước mặt và xoay lưng vào nạn nhân để nạn nhân tự ôm lấy cổ		
2	Hai tay giữ chặt vào đùi nạn nhân rồi đứng lên từ từ sao cho lưng người cứu vẫn thẳng.		
3	Công nạn nhân đi từng bước nhẹ nhàng hạn chế đau đớn cho nạn nhân		

BẢNG KIỂM: PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN (Phương pháp hai người)

TT	Nội dung	Có	Không
DI CHUYỂN NẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NẠN NHÂN NGỒI TRÊN HAI TAY BẮT CHÉO			
1	Hai người cứu ngồi xổm hai bên nạn nhân, bắt chéo tay sau lưng và nắm lấy thắt lưng quần nạn nhân.		
2	Luồn tay kia phía dưới đầu gối nạn nhân, người này nắm lấy cổ tay người kia.		
3	Ôm chặt người nạn nhân, cùng nâng nạn nhân lên nhẹ nhàng.		
4	Cả hai người cứu cùng bước đi để di chuyển nạn nhân chậm sao cho lưng người vận chuyển vẫn thẳng.		
VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN BẰNG CÁNG			
* Mở cang			
1	Đặt cang nghiêng sang một bên, tháo dây cột và mở chân cang ra		
2	Dùng chân đẩy thanh ngang bên ngoài ra		
3	Dùng đứng cang lên và ấn mạnh xuống thanh ngang còn lại để mở ra. (Nếu cả hai thanh ngang quay vào trong, dùng đứng thanh ngang ra và dùng chân đạp mạnh vào)		
* Đặt nạn nhân lên cang			
4	Cùng với người phụ giúp (lý tưởng 5 người) nhẹ nhàng nghiêng nạn nhân sang một bên.		
5	Đặt cang sát lưng rồi đồng thời lật nạn nhân nằm ngửa trên cang an toàn		
* Khiêng cang			
6	Bốn người đứng ở tay cầm, nếu chỉ có ba người thì hai người ở đầu, một người ở cuối cang		
7	Theo hiệu lệnh tất cả cùng nâng cang lên và giữ sao cho người nạn nhân thẳng bằng.		
8	Chân phía bên cang bước về phía trước rồi bước đi (bước ngắn) đều nhau và chậm.		
9	Đến địa điểm dừng cang, ngồi xổm xuống rồi hạ cang nhẹ nhàng		
* Gập cang			
10	Để cang nghiêng sang một bên, dùng chân ấn mạnh vào bản lề của thanh ngang		
11	Gập hai đầu cang lại và buộc lại gọn gàng		



**THƯ VIỆN
HUBT**

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ

Tổ chức cấp cứu hàng loạt

1C: Túi thuốc và dụng cụ, 1B: Phòng cấp cứu, 2C: Bảng tam giác, 2A: Bảng cuộn, 3: D, 4: C, 5: D, 6: A, 7: B, 8: A, 9: B, 10: B

Phân loại và chọn lọc người bị nạn

1A: duy trì, 1B: thay thế, 2A: hạn chế, 2B: làm ngừng, 3B: Điều kiện lao động, 3C: Con người, 4B: Vùi lấp. 5: A, 6: A, 7A, 8B, 9A, 10A

Sơ cứu vết thương

1B: Bảng tam giác, 1C: Băng dính, 2A: Vòng sau, 2B: Trước, 3A: Tách rời, 3B: Khoảng trống, 4A: Đề lên, 4B: Chiều rộng, 5A: Thường, 5B: Gấp lại, 6A: Bất chéo, 6B: Đề lên, 7A: Xuất phát, 7B: Trở về, 8: C, 9: B, 10: A, 11: A, 12: B, 13: A, 14: B, 15: A, 16: B.

Phòng chống sốc

1A: nặng, 1B: chuyển hóa, 2B: Do tim, 2C: Do giãn mạch, 3: B, 4: A, 5: B, 6A, 7B, 8B, 9A, 10B

Sơ cứu người bị bỏng

1A: Hoá chất, 2A: Thương bì, 2B: Không để lại sẹo, 3A: 48, 3B: 2, 4A: Nước chanh quả, 4B: Acid acetic 0,5%..., 5D, 6D, 7C, 8A, 9B, 10B, 11B, 12A, 13A, 14A.

Cầm máu - ga rô

1A: Ngoài, 2A: Trong, 3A: 1, 3B: 1 – 2 phút, 4C: Gấp chi tối đa, 4D: Ga rô cầm máu

5B: Phẫu thuật hoặc cắt cụt chi, 6A: Theo dõi, 6B: Hộ tống, 7A: 6 giờ, 8A: 2cm, 8B: 5cm, 9B, 10C, 11C, 12D, 13A, 14A, 15B, 16B, 17A, 18B, 19B, 20A

Cấp cứu người bị ngừng hô hấp - tuần hoàn

1A: Vào phổi, 1B: Ra ngoài, 2A: Cử động, 3A: Giá lạnh, 4A: Kiên trì, 5A: 1/3 dưới, 6A: Tình trạng, 7C, 8C, 9B, 10A, 11A, 12B, 13A, 14B, 15B, 16B, 17A

Sơ cứu gãy xương

1A: Gãy trực tiếp, 1B: Gãy gián tiếp, 2A: Kín, 2B: Hở, 3A: Giảm đau, 4A: Tổn thương, 5A: Đầu xương gãy, 6C, 7D, 8A, 9A, 10A, 11B, 12B, 13B, 14A



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Điều dưỡng cơ bản. NXB Y học, 2007.
2. Giáo trình giáo dục quốc phòng tập II. NXB Giáo dục, 2002.
3. Cấp cứu nội khoa. NXB Y học, 2000.
4. Cấp cứu tại chỗ trong các cơ sở tại chỗ. NXB Y học, 2001
5. Cẩm nang sơ cấp cứu trẻ em và người lớn. NXB Phụ nữ, 2004
6. Fundamentals of Nursing. Patricia A. Potter, RN, MSN, PhD. Anne Griffin Perry, RN, MSN, EdD. ISBN 0-323-01141-1.2001
7. Clinical Nursing Procedures. Lisa Dougherty and Sara Lister. ISBN-13; 978.14051-0161-5

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

CẤP CỨU BAN ĐẦU

Chịu trách nhiệm xuất bản


HOÀNG TRỌNG QUANG

<i>Biên tập:</i>	BS. NGUYỄN LAN
<i>Sửa bản in:</i>	NGUYỄN LAN
<i>Trình bày bìa:</i>	CHU HÙNG
<i>Kt vi tính:</i>	BÙI THỊ THƯƠNG

In 1000 cuốn, khổ 19 x 27cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Y học.

Giấy phép xuất bản số: 33 - 2008/CXB/433 - 175/YH

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2008.



NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Địa chỉ: 352 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

Tel: 04.7.625922 - 7.625934 - Fax: 04.7625923

Website: www.xuatbanyhoc.vn

E-mail: Xuatbanyhoc@fpt.vn

Chi nhánh: 699 Trần Hưng Đạo - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.9235648 * Fax: 08.9230562

Cấp cứu ban đầu (25000)



1803100000043

25,000

7

